

بارداری و شیردهی :

قبل از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت نمائید.

بنفوتامین®

(بنفوتیامین)

قرص ۵۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلی گرم

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف این فرآورده را پزشک تعیین می کند ولی میزان مصرف معمول این فرآورده ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلی گرم در روز می باشد.

دسته دارویی :

بنفوتیامین از دسته ویتامین های گروه ب می باشد.

هشدارها :

- قرص بنفوتیامین را مطابق با دستور پزشک مصرف نمائید.
- قرص بنفوتیامین را می توانید قبل یا بعد از غذا مصرف نمائید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فرآورده، نوبت بعدی را دو برابر نکنید.

مکانیسم اثر :

بنفوتیامین یک پیش ساز محلول در چربی تیامین (ویتامین B1) است که در داخل سلول به تیامین تبدیل می شود. این ماده نسبت به تیامین زیست دستیابی بیشتری دارد و در صورت تجویز خوراکی، سطح تیامین را در خون افزایش می دهد. به نظر می رسد که بنفوتیامین خاصیت آنتی اکسیدانی داشته باشد. از سوی دیگر از آنجایی که تیامین نقش های حیاتی متعددی در متابولیسم گلوکز ایفا می کند، به نظر می رسد که بنفوتیامین بتواند مزایای درمانی موثری در پیشگیری و درمان عوارض ناشی از بالا بودن سطح قند خون مانند نوروپاتی محیطی دیابتی، رتینوپاتی دیابتی، نفروپاتی دیابتی، بیماریهای عروق محیطی و بیماریهای قلبی-عروقی داشته باشد.

عوارض جانبی :

بنفوتامین تا دوزهای ۶۰۰ میلی گرم در روز به خوبی تحمل می شود. گزارشات نادری از بروز سردردهای گذرا وجود دارد.

شرایط نگهداری :

- فرآورده را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.
- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمائید.

راهنمایی های عمومی :

- قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
- در صورت سابقه حساسیت به بنفوتیامین، تیامین هیدروکلراید و یا هر نوع فرآورده، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو و مکمل های غذایی

موارد مصرف :

پیشگیری و درمان اختلالات ناشی از کمبود ویتامین B1.