

دوز نگهداری: پس از برقراری دوز اولیه می توان طی مدت ۸-۴ هفته دوز دارو را به ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم سه بار در روز افزایش داد. معمولاً دوز بالاتر از ۵۰ میلی گرم سه بار در روز فقط برای افراد بالای ۶۰ کیلوگرم توصیه می شود. هنگامی که به یک دوز موثر و قابل تحمل رسیدید حتماً آنرا حفظ کنید.

توجه:

- حداکثر دوز دارو برای افراد کمتر از ۶۰ کیلوگرم ۵۰ میلی گرم سه بار در روز و برای افراد بالای ۶۰ کیلوگرم ۱۰۰ میلی گرم سه بار در روز می باشد.
- بیمارانی که این دارو را همراه با سایر داروهای ضد قند استفاده می کنند بایستی تنظیم دوز در آنها انجام شود. اینکار به دستور پزشک انجام می شود.
- قرصهای آکاربوز بایستی حتماً سه بار در روز در ابتدای غذا خوردن در هر وعده میل شوند.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت کنید:

درد شکم، اسهال، نفخ، کاهش هماتوکریت، کاهش کلسیم سرم، کاهش ویتامین B6 پلاسما، علائم ازدیاد حساسیت مثل راشهای پوستی و ادم.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران جدا خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورت مصرف سایر داروها نظیر دیورتیکهای تیازیدی، کورتیکو سترئوئیدها، فنوتیازینها، داروهای تیروئیدی، استروئیدها، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنی توئین، اسید نیکوتینیک، سمپاتو میمتیکها، مهار کننده های کانالهای کلسیمی، ایزونیازید، ذغال فعال، پانکراتین یا دایجستیو و دیگوسکین.
- در صورت ابتلاء به هر نوع بیماری خصوصاً بیماریهای کلیوی
- در صورت نیاز به انجام تستهای آزمایشگاهی
- در صورت باردار بودن یا قصد به بارداری و شیردهی

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود مگر به صلاحدید پزشک متخصص. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

- به هنگام مصرف توأم این دارو با سایر داروهای ضد قند خون، حتماً به عارضه کاهش قند خون توجه کنید.
- مصرف این دارو می تواند موجب تغییر در برخی نتایج تستهای آزمایشگاهی شود، لذا پزشک خود را از مصرف این دارو آگاه کنید.
- به هنگام قرار گرفتن در شرایط استرس مثل تب، تروما، عفونت یا جراحی احتمال از دست رفتن کنترل گلوکز خون وجود دارد، لذا پزشک خود را از موضوع آگاه کنید.
- قرصهای آکاربوز را حتماً با شروع اولین لقمه غذا و حتماً با هر وعده غذا مصرف نمائید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

دوز اولیه: دوز اولیه توصیه شده جهت مصرف آکاربوز ۲۵ میلی گرم سه بار در روز می باشد.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان