

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمائید.

- کلیه داروها را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

- دوره درمان را کامل کنید.

- مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می باشد.

- چنانچه سؤال یا نکته مهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، با پزشک یا داروساز خویش تماس بگیرید.

### راهنمایی های عمومی :

لازم است قبل از مصرف این دارو چنانچه بیمار دارای هر یک از شرایط زیر می باشد،

پزشک خویش را مطلع سازد :

سابقه بیماری های کلیوی، اختلالات کبدی و مشکلات عصبی.

### مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف در بارداری :

انجمن غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی برادران حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و با مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

مصرف در شیردهی :

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می شود، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

### موارد احتیاط :

- مصرف این دارو در بیماریانی که اختلالات عملکرد کلیوی دارند و یا همزمان از داروهایی که دارای عوارض کلیوی هستند استفاده می کنند باید با احتیاط همراه باشد.

- مصرف این دارو در بیماریانی که دارای بیماری زمینه ای نورولوژیک بوده و یا از اختلالات کبدی یا اختلالات آب و الکترولیت رنج می برند باید با احتیاط صورت گیرد.

- در صورت بروز علائمی از قبیل قرصزی پوست، خارش، کهیر، سرگیجه، احساس عدم تعادل، بی خوابی، بی قراری، گیجی، منگی، لرزش دست ها، تهوع و تهوع و تسخ بیمار باید پزشک را مطلع کند.

- از آنجایی که مصرف همزمان این دارو با برخی از داروها دارای تداخل دارویی می باشد، لذا چنانچه از داروهایی زیر استفاده می کنید، پزشک خود را مطلع سازید :

مصرف همزمان این دارو با پروپنسید باعث کاهش دفعه آن می شود و به همراه زیدوودین ممکن است سبب افزایش خواب آلودگی و لتاریزی شود.

- مصرف این دارو باعث تغییر در نتایج آزمایشات BUN، کراتینین سرم و آزمون های عملکرد کبدی می گردد.

- به استثناء موارد خاص که پزشکتان لازم می داند، این دارو در موارد زیر منع استعمال دارد:

حساسیت شدید به آسیکلوویر و یا هر یک از اجزا متشکله.

توجه: در صورت بروز خستگی و ضعف غیر عادی که ممکن است نشانه دهیدراتاسیون ضعف و ناراحتی اولیه کلیوی باشد، بیمار باید پزشک را مطلع کند.

### مقدار و نحوه مصرف :

این دارو را دقیقاً مطابق شیوه ای که پزشکتان دستور داده استفاده فرمائید. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است :

دوز بزرگسالان : در درمان عفونت های اولیه هرپس ژنتیال، بیمارانتیبا منتخب با عفونت های راجعه شدید ویروسی و برای پیشگیری به منظور کاهش شیوع و شدت عفونت های راجعه ویروسی بسته به شدت عفونت ۸۰۰-۲۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت، ۵ بار در روز تجویز می شود.

توجه: دوز مصرفی در بیماریانی که دارای اختلالات عملکرد کلیوی حاد یا مزمن می باشند باید تعدیل گردد.

دوز کودکان ۱۲-۲ سال : مقدار مصرف در کودکان تا وزن ۴۰ کیلوگرم، ۲۰۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر ۸۰۰ میلی گرم در هر دوز) هر ۶ ساعت می باشد.

توجه: مصرف مطمئن و بی خطر این دارو به صورت خوراکی در کودکان زیر ۲ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف لازم است به نکات زیر توجه فرمائید :

هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک تجاوز نفرمائید.

این دارو را می توان با معده خالی یا همراه غذا با یک لیوان آب مصرف نمود.

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن از مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمائید.

### عوارض جانبی :

به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند، اگر چه همیشه و تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. این عوارض عبارتند از :

مهمترین : اختلالات کلیوی، سرگیجه، احساس عدم تعادل، بی خوابی، بی قراری و کاهش عملکرد مغزی.

شایع ترین : تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد.

نادر : تب، عصبانیت، تشن، دیلیزیوم، احساس سبکی سر، دردهای عضلانی و مفاصل، اختلالات قاعدگی، ادم، اذم، کهیر، جوش و ریزش مو.

### مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه :

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم، فوراً با پزشک خویش تماس حاصل فرمائید و یا خود را به یک واحد درمانی برسانید.

### شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

- دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و در بسته بندی اصلی نگهداری فرمائید.

- از مصرف داروهایی تاریخ گذشته جدا خودداری فرمائید.

