

# قرص سرماخوردگی بزرگسالان

استامینوفن ۳۲۵ / فنیل افیرین هیدروکلرايد ۵ / کلرفینیر امین مالت ۲

- افراد مسن نسبت به عوارض این دارو حساس ترند. عوارضی مانند گیجی، خواب آلودگی، دفع دردناک ادرار، احساس ضعف، خشکی دهان، بینی یا گلو ممکن است در بیماران مسن بیشتر اتفاق بیفتد.
- در صورت داشتن هر گونه عمل جراحی در مورد مصرف این دارو با پزشک یا دندانپزشک مشورت کنید.

## مقدار و نحوه مصرف :

- بزرگسالان و افراد ۱۲ سال به بالا ۱-۲ قرص هر ۶-۴ ساعت .
- در مورد مصرف دارو در کودکان زیر ۱۲ سال با پزشک مشورت کنید.

## عارض ضریبی :

هر دارو به موارد اشرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در بک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بررسی هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

## عارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند :

عارض نادر: تشنج، توهمندی، ضربان نامنظم، قلب، اشکال در تنفس، درماتیت آرثیک، رعد شدن پوست یا پشم ها و نارسایی های کلیوی.  
عارضی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارد: بی قراری، اشکال در خواب رفتن، عصبانیت، سر درد، افزایش تعزیری، تهوع و استفراغ، ضعف، اشکال در دفع ادرار، خواب آلودگی، سرگیجه، خشکی دهان، بینی یا گلو و کاهش اشتها.

## مسنومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسومون متنقل نمایید.

## شایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و دردمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

سرماخوردگی بزرگسالان یک ترکیب ضد احتقان، ضد حساسیت و مسکن است که چهت درمان عالائم سرماخوردگی و آنفلانزا نظیر آبریزش بینی، عطسه، احتقان سینوس و بینی، تب و درد و واکنشهای حساسیتی قابل مصرف می باشد.

## راهنماییهای عمومی :

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت ساینده حساسیت به هر نوع دارو از جمله استامینوفن، کلرفینیر امین یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله دیابت، فشار خون، پرکاری تیروئید، هیاتیت یا سایر بیماریهای کبدی، انسدادهای ادراری و نارسایی کلیوی، بیماریهای قلبی-عروقی، گلوكوم و بیرونی پرستات.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد افسردگی، سالیسیلات‌ها، داروهای پایین آورنده فشار خون و فرآورده های حاوی الکل.

## مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحیت پزشک متخصص.

## هشدارها :

- دارو را مطابق دستور مصرف نمایید. دارو را بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک یا داروساز مصرف نکنید.
- همزمان با این دارو از مصرف سایر فرآورده های حاوی استامینوفن خودداری نمایید.
- در صورتیکه عالائم بیماری بهبود نیافت یا بدتر شد و در صورت وجود تب شدید با پزشک مشورت کنید.
- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض یادآوری آن را مصرف نکنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده است از مصرف آن نوبت حررظیر کنید و مصرف دارو را طبق برنامه معمول ادامه دهید. مقدار مصرف دارو را دو برابر نکنید.
- به منظور کاهش تحريك گوارashi دارو را با غذا، آب یا شیر مصرف نکنید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان از ارتدگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.