

### مقدار مصرف:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین میکند ولی متوسط مقدار مصرف دارو به قرار زیر است:

کودکان: مقدار مصرف دارو تعیین نشده است.

بزرگسالان: ۱ تا ۲ قرص ۳ بار در روز

### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود که در طی دوره درمان با انطباق بدن با دارو رفع می شود با این وجود در صورت ادامه هر کدام از این عوارض با پزشک خود مشورت کنید:  
با شیوع بیشتر: درد شکمی، تهوع، استفراغ، خشکی دهان، اسهال.

با شیوع کمتر: سر درد، ضعف، خواب آلودگی، حساسیت.  
با شیوع نادر: کاهش تعداد پلاکتها، افزایش آنزیمهای کبدی.

### مسمومیت:

بیمار را وادار به استفراغ کرده و سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

### شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.  
- این دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و در درون جعبه نگهداری کنید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

### راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوع غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی هیستامین، داروهای حاوی کافئین، داروهای ضد احتقان.
- در صورت ابتلا به آسم، زخم معده، فتوکروموسیتوما.

### مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحدید پزشک متخصص.

### هشدارها:

- دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف ننماید.
- برای کاهش تحریک گوارشی دارو را بعد از غذا مصرف کنید.
- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوردن آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی رسیده باشد از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.
- از رژیم غذایی کم نمک استفاده ننماید.