

- در صورت مصرف بیش از یک تا دو هفته، قبل از مشورت با پزشک دارو را قطع نکنید چرا که ممکن است قطع تدریجی آن توسط پزشک لازم باشد.

- اینمنی و اثر بخشی این دارو در افراز زیر ۱۸ سال ثابت نشده است.
- در طول یک شب بیش از یک دوز را مصرف نکنید.

#### مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو و طول مدت درمان را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به صورت زیر می باشد :

بزرگسالان : ۱۰ میلی گرم هنگام خواب
سالمندان : ۵ میلی گرم هنگام خواب.

#### عارض جانی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:

سرگیجه، سر درد، درد عضلانی، تهوع، قاعده‌گی دردنگ، فراموشی، ضعف و خستگی، افسردگی، اضطراب، اختلالات بینایی، راش، خارش و کاهش اشتها.

#### مسومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

#### شایع نگهداری :

- دارو را نور از دسترس کودکان نگهداری کنید.  
 - دارو را دور از نitor و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

#### راهنماییهای عمومی :

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت سابقه حساسیت به زالپلون و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظه و ماده رنگی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای تعییف کننده سیستم عصبی مرکزی، دیفنین هیدرامین، ایمی پرامین، سایمتبین، کاربامازین، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامین و الک.
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله نارسایی های کبدی و کلیوی، بیماریهای تنفسی، افسردگی، سایقه سوء مصرف دارو یا واستگی دارویی و سایقه سوء مصرف الک.

#### مصرف در بارداری و شیردهی :

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با تجویز و صلاح‌دید پزشک متخصص.

#### هشدارها :

- دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.
- دارو را بالا فاصله قبل از خواب مصرف نمایید.
- دارو را با معده خالی مصرف نمایید. مصرف این دارو همراه یا بالا فاصله بعد از غذای سنگین و چرب باعث کاهش جذب و اثر بخشی دارو می گردد.
- همراهان یا این دارو، الکل یا سایر داروهای ضعیف سیستم عصبی مرکزی استفاده نکنید.
- مصرف این دارو باعث خواب آسودگی می شود که ممکن است تا روز بعد ادامه یابد در اینصورت از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- بدون مشورت با پزشک مقدار داروی خود را افزایش ندهید.
- مصرف این دارو در درمان کوتاه مدت، حداقل دو هفته می باشد.