

# آمین®

## شربت کتوتیفن (1mg / 5ml)

مقدار و نحوه مصرف :  
مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید  
ولی مقامار مصرف معمول این دارو بصورت زیر می باشد:  
پیشگیری از آسم :

بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۳ سال :  
مقدار یک میلی گرم (۵ میلی لیتر شربت) دوبار در روز،  
صبح و عصر.

کودکان ۶ ماهه تا ۳ ساله :  
۰/۵ میلی گرم یا ۵۰ میکروگرم برای هر کیلوگرم وزن  
بدن، دوبار در روز، صبح و عصر.

### عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است  
باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه  
همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت  
بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

عوارض کمتر : عالمی شبه آنفولانزا و عفونت تنفسی.  
با شیوع کمتر : شایع: افزایش وزن  
عوارضی که در صورت تداوم و یا ایجاد مراحمت نیاز به  
توجه پزشکی دارند :  
شایع: افزایش وزن  
شیوع نادر: درد شکمی، تحریک سیستم عصبی مرکزی،  
سرگیجه، خشکی دهان، خون دماغ، افزایش اشتها،  
خواب آلودگی، راش پوستی، اشکال در بخواب رفتان،  
تورم پلک چشم.

### مسومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به  
بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

### شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.  
دارو را دور از سور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد  
نگهداری و از بخ زدگی محافظت نمایید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا  
از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به  
دیگران خودداری ننمایید.

### راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود  
مشورت کنید:

- در صورت سایقه حساسیت به کتوتیفن و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظه و ماده رنگی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای خسد دیابت خوارکی، آنتی هیستامین ها، خواب آورها، آرامیش ها و الکل.
- در صورت ابتلاء به هر نوع بیماری از جمله دیابت شیرین و صرع.

### صرف در بارداری و شیردهی :

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی جایز نیست  
مگر باصلاح دید پزشک متخصص.

### هشدارها:

- دارو را فقط با نظر پزشک مصرف نمایید.
- بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنید.
- این دارو در حملات آسم استفاده نمی شود و فقط برای پیشگیری موثر است.
- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید  
به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر  
تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از  
صرف آن خودداری کنید و مقدار مصرف نوبت بعدی  
را نیز دو برابر نکنید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی  
گردد لذا ضمن درمان از راندگی و کار با وسایلی که  
نیاز به هوشیاری کامل دارد، خودداری کنید.
- گاهاً به علت تحریک سیستم عصبی مرکزی هیجان  
زدگی و بی خوابی بخصوص در کودکان دیده می شود.



شرکت داروسازی آمین  
ایران - اصفهان