

پکسول آمودل®

اماونتادین هیدروکلراید

- در صورت مصرف این دارو در تا خیه پا لکه های شیبکه مانند به رنگ قرمز مایل به ارغوانی بر روی پوست ایجاد میگردد این لکه ها در عرض ۲ تا ۱۲ هفته پس از قطع دارو تدریجی از بین میرود.

- اگر داروهای دیگری پا داروهایی که اختیاج به نسخه پزشک ندارند را بطور همزمان با این دارو مصرف می نمایند حتماً به پزشک اطلاع دهید.

- در صورت ابتلا سه بیماریهای عروقی مغز، اگزما، صرع، بیماریهای قلبی عروقی و ... در مورد مصرف این دارو با پزشک مشورت شود.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین میکند.

عواصر جانبی:

هر دارو به مواد اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:

عواصر با شیوع کمتر:

اغتشاش فکری بخصوص در بیماران مسن، توهمات (دیدن، شنیدن) تغییرات خلقی یا روانی، اشکال در دفع ادرار خصوصاً در بیماران مسن، از حال و قتن.

عواصر نادر:

تشنج، تیزی در بینایی، اشکال در تطبیق، تحریک و تورم چشمها، افسردگی، راش پوستی، تورم پاها، کوتاهی تنفس.

عواراضی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند:

عواصر شایع :

اشکال در تمرکز، سرگیجه، تحریک پذیری، کاهش اشتها، تهوع، عصبانیت، لکه ها به رنگ قرمز مایل به ارغوانی بر روی پوست، اشکال در بخواب رفتن یا کاوشهای شبانه.

با شیوع کمتر :

تاری دید، پوست، خشکی دهان، بینی و گلو، سردرد، خستگی یا ضعف غیر عادی، مسمومیت :

در صورت بروز مسمومیت، بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسومون منتقل کنید. شرایط نگهداری :

- دارو از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- دارو را در از دسترس اطفال نگهداری کنید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و با توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به هرگونه دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظت.

- در صورت مصرف این دارو با بیماری هایی نظیر: اگرما، صرع، بیماریهای قلبی، کلیوی، عصبی، ادم.

- در صورت مصرف همزمان هر نوع دارو از جمله داروهای انتسی کولینزیک، داروهای محرك سیستم عصبی مرکزي، کینین، کوتیلیموکسانژول.

صرف در بارداری و شیوه دهنده :

این دار در بارداری و شیوه دهنده منع مصرف دارد مگر با صلاحیت پزشک متخصص.

هشدارها :

- مصرف این دارو بپتانست قبل از تماس یا بالافصله بعد از تماس با افرادی که دچار آنفلوکزا هستند شروع کردد.

- دور دمان را کامل کنید حتی اگر بعد از چند روز بپهودی نسبی حاصل نمایند.

- در دمان رعایت احتیاطهای و برویس مصرف تمام مقابله دارو در وقت معین دارای اهمیت می باشد و هیچ یک از نویتهاي مصرف نیاز دارد فراموش شود. در صورتیکه یک نویست مصرف دارو فراموش نویت بعدی در وا رسیده باشد آنرا مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نویت بعدی در وا رسیده باشد آنرا مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را زیر تو بابر نکنید.

- در صورت عدم بپهودی قوت و برویس پس از چند روز به پزشک مراجعة کنید.

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف ننماید.

- در دمای سیستمیکی در صورتیکه یک نویست مصرف دارو را فراموش کردید به محفض بساد آوردن آنرا مصرف کنید ولی اگر کمتر از چهار ساعت به زمان نویت بعدی باقی مانده است آنرا محفض نکرده نویت بعدی را زیر تو بابر نکنید.

- بپهودی علامات بیماری معرفی شود از ۲ روز شکار میگردد ولی ممکن است در بعضی افراد از ۴ هفته بطور ایجاد.

- در صورت تدریجی فیزیکی را باید تدریجی شروع نمود.

- در صورت کاهش تدریجی اثر دارو در دمای دیسکنتری به پزشک مراجعة نمائید.

- قبل از اطلاع در دمای سیستمیکی با این دارو سه پزشک مراججه کنید زیرا ممکن است کاهش تدریجی مقادیر مصرف دارو ضرورت داشته باشد.

- ممکن است این دارو باعث سرگیجه، منگی، انتشار شعور یا تاری دید گردد، به همین دلیل در کارهایی که احتیاج به هوشیاری دارد نظری و اندانگی احتیاط کنید.

- از برخاستن ناگهانی از وضعیت خوابیده یا نشسته خودداری کنید.

- احتمال مروز خشکی دهان و گلو و بینی وجود دارد در این موارد می توان از آدمان یا یخ استفاده نمود، اگر خشکی دهان بیش از ۲ هفته ادامه یافت به پزشک مراجعة کنید.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان