

این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو و هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت مصرف دارو ها بخصوص الکل، ضد قارح های آژولی، سیکلوسپورین، اریترومايسين، مشتقات فیبریک اسید، نیاسین، دیگوکسین، سایمتیدین، آنتی اسید ها، کتوکنازول، اسپیرینولکتون و ضد بارداری های خوراکی.

- در صورت سابقه بیماری های کبدی، افت فشار خون، جراحی های عمده، عفونت های حاد، میوپاتی، تشنج های کنترل نشده، بالا رفتن سطح ترانس آمیناز و اختلالات متابولیکی.

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است.

هشدارها :

- دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده توسط پزشک خودداری کنید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن دارو را مصرف نمائید ولی اگر به زمان مصرف بعدی زمان زیادی باقی نمانده است مطابق برنامه معمول عمل کنید و از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی دارو نیز خودداری نمائید.

- برای کنترل کلیه مراحل درمان در تاریخ های منظم به پزشک خود مراجعه نمائید.

- در صورت ایجاد درد در عضلات و ضعف عضلات حتماً به پزشک مراجعه نمائید.

- در صورت مصرف این دارو در مورد روش مناسب جلوگیری از بارداری با پزشک خود مشورت کنید.

- هر روز دارو را در یک زمان مشخص مصرف نمائید.

- در صورت داشتن درمان های اورژانسی و جراحی های بزرگ حتماً با پزشک خود مشورت نمائید.

مقدار و نحوه مصرف :

بزرگسالان :

- پیشگیری از بیماریهای کرونر قلب : ۱۰ میلی گرم در روز

- هایپرکلسترولمی فامیلیال و غیر فامیلیال هتروزایگوت :

بطور معمول ابتدا ۱۰ میلی گرم در روز می باشد که بر اساس تشخیص پزشک بعد از ۲-۴ هفته ممکن است تا ۸۰ میلی گرم در روز نیز افزایش یابد.

- هایپر کلسترولمی فامیلیال هموزایگوت : ۱۰ تا ۸۰ میلی گرم در روز
کودکان :

- هایپر کلسترولمی فامیلیال هتروزایگوت :

در پسران و دختران قبل از قاعدگی در رنج سنی ۱۷-۱۰ سال به طور معمول ۱۰ میلی گرم یکبار در روز.

در کودکان زیر ۱۰ سال مطالعات کافی صورت نپذیرفته است.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز مزاحمت هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمائید:

سرفه، راش های پوستی، تورم پلک یا لب ها، صورت و حلق، عطسه و مشکل در بلع، اختلالات عملکرد کبدی، اختلالات ماهیچه ها شامل میوپاتی و سیالژی و گرفتگی عضلات، درد معده، اسهال، یبوست، تهوع، رابدومیالوز، آنافیلاکسی، اریتماتولتی فرم، سندرم استیونس-جانسون، سردرد، عفونت، سینوزیت و سندرم فلو.

مسمومیت :

در صورت مصرف بیش از حد مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل نمائید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

- به تاریخ انقضای قید شده روی جعبه دارو توجه و از مصرف داروی تاریخ گذشته جداً خودداری فرمائید.

