

شربت بیبی کلد[®] (با طعم توتی فروتی)

استامینوفن/دیفن هیدرامین/فنیل افرین

بیبی کلد یک ترکیب مسکن، ضد حساسیت و ضد احتقان است که جهت درمان علائم سرماخوردگی و آنفولانزا نظیر آبریزش بینی، عطسه، احتقان سینوس و بینی، تب و درد و واکنش‌های حساسیتی قابل مصرف می‌باشد.

راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت سابقه حساسیت به استامینوفن، دیفن هیدرامین، فنیل افرین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر دیابت، بزرگی پروستات، انسداد مجاری ادراری یا دشواری دفع ادرار، گلوکوم، هیاتیت، بیماری‌های قلبی-عروقی، پر فشاری خون، بیماری‌های کلیوی و پرکاری تیروئید.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی کولینرژیک، داروهای ضد افسردگی، داروهای پایین آورنده فشارخون و داروهای محرک یا تضعیف کننده سیستم عصبی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود مگر با صلاحدید پزشک متخصص

هشدارها:

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

- همزمان با این دارو از مصرف سایر فرآورده‌های حاوی استامینوفن خودداری شود.

- به منظور کاهش تحریک گوارشی دارو را با آب، شیر یا غذا مصرف کنید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض یادآوری آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی رسیده است، از آن نوبت صرف نظر کرده و مصرف دارو را طبق برنامه معمول ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو خودداری کنید.

- در صورت عدم بهبود و یا تشدید علائم بیماری و یا قطع نشدن تب با پزشک تماس بگیرید.

- افراد مسن نسبت به عوارض این دارو حساس ترند. عوارضی مانند گیجی، خواب آلودگی، دفع دردناک ادرار، احساس ضعف، خشکی دهان، بینی یا گلو ممکن

است در بیماران مسن بیشتر اتفاق بیفتد.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان بایستی از کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد پرهیز شود.

- در صورت در پیش داشتن هر نوع عمل جراحی مانند جراحی دندان یا پزشک یا دندانپزشک خود تماس بگیرید.

مقدار و نحوه مصرف:

- بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال به بالا: ۱۰ تا ۲۰ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت (حداکثر ۶ بار در روز)

- کودکان ۶ تا ۱۲ سال: ۵ تا ۱۰ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت

- کودکان ۶-۴ سال: تعیین دوز فقط با تجویز پزشک می‌باشد.

- مصرف این دارو در کودکان زیر ۳ سال توصیه نمی‌شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، ولی در صورت بروز مزاحمت هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت کنید.

عوارضی که در صورت بروز نیاز به توجه پزشکی دارند:

تشنج، تومم، ضریان نامنظم قلب، تنگی نفس یا اشکال در تنفس، بشورات پوستی، کهیر یا خارش، کدورت ادرار، ضعف یا خستگی غیر عادی، هیاتیت (زرد شدن پوست یا چشمها)

عوارضی که در صورت تداوم یا مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارند:

عصبانیت، بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، خواب آلودگی، خشکی دهان، بینی یا گلو، درد معده، تاری دید، اغتشاش شعور و غلیظ شدن ترشحات موکوسی.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان