

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو را پزشک بر اساس سن و نوع بیماری تعیین می کند.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته گردد.

اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد در صورت بروز هر کدام با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض جانبی که در طی مصرف دارو ممکن است دیده شود :
گیجی، ناراحتی گوارشی، سردرد، ضعف، احساس افسردگی
در موارد نادری نیز عوارض خارج هرمی، خستگی و واکنش حساسیتی پوست گزارش شده است.

مسمومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری :

- دارو را درون جعبه و دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو و سایر آنتی هیستامین ها، یا هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ.
- در صورت ابتلا به فشار خون و یا پارکینسون
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر پایین بودن فشار خون، بیماری قلبی، کبدی، پروستات، بیماری پارکینسون، گلوکوم، صرع.

مصرف در بارداری و شیردهی :

این دارو به هیچ وجه در بارداری و شیردهی مصرف نشود مگر به صلاحدید پزشک متخصص.

هشدارها :

- در صورت تحریک معده دارو را بعد از غذا مصرف کنید.
- احتمال بروز خواب آلودگی با مصرف این دارو وجود دارد. بنابراین هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که به هوشیاری کامل نیاز دارند احتیاط کنید.
- مصرف دارو در افراد مسن بویژه در دوز بالا باید با احتیاط صورت گیرد. زیرا احتمال بروز علائم شبیه پارکینسون وجود دارد.

- کودکان به عوارض دارو حساس تر می باشند.

- این دارو گاهی موجب ایجاد خشکی دهان می شود.

