

# سپیرووفکت

سپیروفلوکساسین

قرص روکشدار ۵۰۰ میلی گرمی

- در صورت مصرف همزمان داروهای آنتی اسید، سوکرفیت، آهن، مولتی و بتامین های حاوی روی با سپیروفلوکساسین، این داروها را ۶ ساعت قبل و یا ۲ ساعت بعد از سپیروفلوکساسین مصرف کنید.

- اختلال بروز واکنشهای حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد لذا از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری کرده و از خسد آفتاب استفاده کنید.

- در صورت بروز راشن پوستی و یا سایر علائم حساسیتی دارو را فقط کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.

- مصرف سپیروفلوکساسین در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

- این دارو بحداصل حالت گیجی و خواب آلودگی می کند لذا هنگام رانندگی یا کار با لوازمی که نیاز به هوشیاری کامل دارند دقت نمایید.

## مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف دارو و طول مدت درمان را پزشک تعیین می نماید.  
عوارض جانبی:

هر دارو به موارد اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد

لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:  
درد شکم یا معده، اسهال، سرگیجه، سردرد، تهوع یا استفراغ، عصبانیت و بی خوابی.

## ممسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

## شرایط نگهداری:

• دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.  
• دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

## راهنماییهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سایه حساسیت به سپیروفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و زنگ.

- در صورت مصرف داروهای آمینوفیلین، توفیلین، آمیوسارون، داروهای خداسفرسردگی سه حلقه ای، سیزابراید، سوتالول، ترفنادين، داروهای خسد اسید، مکمل های حاوی آهن، سوکرفیت، فنی توئین، کافین و وارفارین.

- در صورت ابتلاء به بیماری هایی نظیر سایه تشنج، تصلب شرایین مغزی، نارسایی کبدی و کلیوی و میاستنی گراو

## مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.  
هشدارها:

- برای برطرف شدن کامل عفونت، دارو را در فواصل زمانی مشخص مصرف نمایید.

- دوره درمان را کامل کنید، حتی اگر بعد از چند روز احساس بهبود نمودید.

- دارو را همراه با یک لیوان پر از آب مصرف کنید و در طول روز نیز آب زیاد بنوشید.

- در صورت عدم بهبود علائم در عرض چند روز یا بدتر شدن آنها با پزشک مشورت نمایید.

- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید به محض به پادآوردن آنرا مصرف کنید. اما اگر زمان نوبت بعدی رسیده است، از مصرف آن نوبت چشم بوشی کنید و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.