

کلماستین

قرص ۱ میلی گرمی

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف این دارو را پزشک تعیین می کند.

عوارض جانبی :

هر دارو به مسازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد در صورت بروز هر کدام با پزشک مشورت کنید.

عوارض جانبی مهم این دارو عبارتند از : خواب آلودگی، خشکی دهان، بینی یا گلو، اختلالات گوارشی، افزایش اشتها یا افزایش وزن، التهاب حلق و غلیظ شدن موکوس.

مسومومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- دارو را دور از سور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- به تاریخ انقضا قید شده روی جعبه دارو توجه و از مصرف داروی تاریخ گذشته جداً خودداری کنید.

صرف در دوران بارداری و شیردهی :

این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود، مگر به صلاحیت پزشک.

هشدارها :

- عوارض جانبی این دارو در افراد مسن بیشتر مشاهده می شود.
- به علت احتمال ایجاد خشکی دهان و در نتیجه احتمال افزایش بیماری های دهان و دندان، بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید.
- دارو را طبق مقدار توصیه شده توسط پزشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده توسط پزشک جداً خودداری کنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض به یاد آوردن دارو را مصرف کرده ولی در صورتی که نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.
- در صورت مصرف داروهای آرام بخش و خواب آور با پزشک مشورت کنید.
- به منظور کاهش تحریکات گوارشی دارو را همراه آب، غذا یا شیر مصرف کنید.