

کلیدینیوم - سی

قرص روکشدار

- با مصرف این دارو ممکن است خشکی دهان، بینی یا گلو ایجاد شود
برای کاهش این عارضه می توان از آدمس یا ذرات یخ استفاده کرد.
در صورتی که این عارضه بیش از ۲ هفته ادامه داشت
به پزشک مراجعه نماید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید ولی مقدار مصرف
معمول این دارو بصورت زیر می باشد :

بزرگسالان : یک یا دو قرص از ۱-۴ بار در روز، ۶۰-۳۰ دقیقه قبل از غذا مصرف می
شود و سپس مقدار مصرف دارو بر اساس نیاز و تحمل بیمار تنظیم می گردد.
توجه : در بیماران مسن یا ناتوان، مقدار شروع نباید بیش از یک قرص دو بار
در روز باشد.
کودکان : مقدار مصرف این دارو در کودکان تعیین نشده است.

عارض جانی :

هر دارو به مواد اشراف مطلوب درمانی ممکن است باعث برخورد پختی
عارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد لیکن
در صورت برخورد بر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.
عارضی که نیاز به توجه پزشکی دارد :

با شیوع کمتر یا نادر : یوست، دردپنهان، افسردگی روانی، بشورات جلدی یا
کهربا، گلودرد و تسب، اشکال در بخواب رفتن، هیجان، عصبانیت، ضربان
احسته قلب، تنگی نفس و زرد شدن چشمها و پوست.
عارضی که در صورت تداوم یا مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارد :

شایع : احساس نفخ، کاهش تعریق، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان، سردید.
با شیوع کمتر : تاری دید، کاهش توانایی جنسی، تهوع، خستگی یا ضعف
غیر عادی.

مسومومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسحومین
 منتقل کنید.

شرايط توجهداری :

- دارو را نور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد توجهداری کنید.
- دارو را در درستوس کودکان توجهداری کنید.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان

راهنماییهای عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد
مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

صرف در بارداری و شیردهی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- در صورت سایقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت ابتلاء به هر نوع بیماری از جمله بیماری های قلسی، گلوکوم،
نارسایی کبدی و کلیوی، انسداد روده، ضعف خطیر عضلانی، هیپرتروفی
پروستات، اختیام ادرار و کولیت اولسراتیو.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی کلینرژیک، آنتی اسید،
ضدآسهال، کوتکونازول و پاتسیم کلارید.

صرف در بارداری و شیردهی :

- مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است مگر به تشخیص پزشک متخصص.
- مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود مگر به تشخیص
پزشک متخصص.

هدسادارها :

- دارو را ۳۰-۶۰ دقیقه قبل از غذا مصرف کنید مگر اینکه پزشک دستور
دیگری داده باشد.

- دارو را تنها با مقدار تجویز شده و طبق دستور پزشک مصرف کنید.

- در صورتی که پک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به پاد آوردن
آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد
از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- از مصرف داروهای آنتی اسید و داروهای ضد اسید می خواهیم که در ساعت پس از
صرف این دارو اجتناب کنید.

- اگر دارو را برای مدت طولانی مصرف می کنید، برای بروزی پیشرفت
درمان، بطور منظم به پزشک مراجعت نمایید.

- پس از مصرف طولانی مدت، برای قطعی مصرف دارو به پزشک مراجعت
کنید زیرا ممکن است به کاهش تدریجی مقدار مصرف دارو نیاز باشد.

- این دارو باعث کاهش تعریق می گردد بنابراین در هنگام فعالیت بدنی یا
در هواي گرم احتیاط کنید زیرا ممکن است در این حالات درجه حرارت
بدن بالا رود و گرمگزی بروز کند.

- این دارو ممکن است باعث سرگیجه، خواب آلودگی یا تاری دید گردد
بنابراین از راندگی و یا کار با ماشین آلتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند
اجتناب کنید.