

- اختلال بروز واکنشهای حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد لذا از قرارگرفتن در معرض نور مستقیم افتات خودداری کرده و از ضدآفتاب استفاده کنید.

- در طول درمان طولانی مدت با کوتربیوموکسازول، انجام آزمایش خون به طور منظم توصیه می شود.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف این دارو توسط پزشک تعیین می گردد.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازن اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:

عوارض کمی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

شایع: افزایش حساسیت پوست به نور خورشید، خارش و بثورات پوستی.

باشیوع کمتر و نادر: درد مفاصل و عضلات، اشکال در بلع، کلودر، تب، خونریزی یا کبودی غیر عادی، زردی چشمها یا پوست، رنگ پریدگی، تاول، پوسته شدن یا قرمی پوست، خستگی یا ضعف غیر عادی، درد ناجه کم، وجود خون در ادرار، درد یا سوزش هنگام دفع ادرار، تورم قسمت

قادمی گردن، اشکال در تنفس و کودکی تا خنک اشتگان، لب یا پوست.

عوارض کمی که در صورت تداوم یا مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارند:

اسهال، سرگیجه، سردرد، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ و زخم دهان یا زبان.

مسومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار را سریعاً به بیمارستان مسومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سایه حساسیت به تری متوریم، سولفونامیدها، فوروزماید، مدرهای تیازیدی، سولفونوپرول ها، مهارکننده های کربنیک آنفیسراز و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت ابتلاء به هر نوع بیماری از جمله بیماریهای خونی، فاوسیم، نارسایی کلیسوی، نارسایی کبدی، بورفیری و کم خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمودوفولیک اسید.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد انعقاد، ضد تشنج، داروهای خوارکی ضد دیابت، داروهایی با عوارض سمیت کبدی، متنامین و متواتر کسات.

مصرف در بارداری و شیردهی :

این دارو در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد مگر با صلاحیت پزشک متخصص

هشدارها :

- کوتربیوموکسازول را همراه با یک لیوان پر از آب مصرف کنید و در طول روز نیز آب زیاد بنوشید.

- دوره درمان را کامل کنید.

- در صورتیکه عالشم بیماری بعد از چند روز بهبود پیدا نکرد و یا بدتر شد با پزشک مشورت کنید.

- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض بیاد آوردن، آنرا مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، آن را مصرف نکنید و میزان مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث سرگیجه گردد لذا ضمن درمان، هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند احتیاط نمایید.

- احتمال مشاهده عوارض جانبی این دارو در سالماندان پخصوص هنگام مصرف هم زمان با دارو های مدر بیشتر می باشد.