

سیپروهپتادین

قرص

مقدار مصرف :

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند.

عواراض جانبی :

هر دارو به موزایات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد در صورت بروز عوارض زیر به پزشک مراجعه کنید.

خواب آلودگی، غلیظ شدن ترشحات نایزه، تناری دید، دفع مشکل یا دردناک ادرار، اختشاش شعور، خشکی دهان، بینی و گلو، ضربان کوینده قلب، افزایش اشتها، زنگ زدن یا همهمه گوش، بشورات جلدی، افزایش وزن.

سمومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو، بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- دور را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

راهنماییهای عمومی :

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
 - در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظه و ماده رژیگی.
 - در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله آسم، آب سیاه، بزرگی پروستات، انسداد مجرای ادرار یا دفع مشکل ادرار.
 - در صورت مصرف هر گونه دارو، از جمله داروهای ضد موسکارینی و داروهای خوب آور و آرام بخش.
- مصرف در بارداری و شیردهی:
 - این دارو در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود مگر با صلاحیت پزشک متخصص.

هشدارها :

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.
- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به محض بیاد آوردن، آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را بیز دیر بر نکنید.
- اختلال بروز خواب آلودگی با مصرف این دارو وجود دارد. لذا هنگام رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد احتیاط کنید.
- به منظور کاهش تحریک گوارشی، دارو را همراه غذا، آب یا شیر مصرف کنید.
- این دارو ممکن است با آزمون های پوستی با استفاده از آرژن ها تداخل نماید. بنابراین لازم است پزشک را از مصرف این دارو مطلع کنید.
- در صورتیکه خشکی دهان بیش از دو هفته ادامه داشت به دندانپزشک مراجعه کنید.