

## شربت دکستاکلد - سی®

با طعم توت فرنگی

استامینوفن / کلرفیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین

- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، اگر دارو را بطور نظم مصرف می کنید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- در صورت عدم بهبود و یا تشدید علائم بیماری و یا قطع نشدن تپ با پزشک تماس بگیرید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان از کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

### مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو، بر حسب نیاز به صورت زیر می باشد :

- کودکان ۱۲ تا ۶ سال : ۵ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت

- مصرف این دارو در کودکان ۲-۶ سال فقط با تجویز پزشک می باشد.

### عواراض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت برزوز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمائید.  
خواب آلودگی، سرگردانی، خشکی دهان، بینی یا گلو، افزایش تعریق، تهوع یا استفراغ، درد معده، اسکال در دفع ادرار، کدورت ادرار، پشورات پوستی، کهیر یا خارش، ضعف یا خستگی غیر عادی و زرد شدن پوست یا چشم ها.

### مسومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده بالاچاله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجمه شود.

### شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.  
- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بیخ زدگی محافظت نمایید.

شربت دکستاکلد - سی یک ترکیب مسکن، ضد حساسیت، ضد سرفه و ضد احتقان است که جهت درمان علائم سرماخوردگی و آنفولاتزا نظری آبریزش بینی، احتقان سینوس و بینی، تپ و درد، واکنش های حساسیتی و درمان سرفه قابل مصرف می باشد.

هر ۵ میلی لیتر شربت حاوی ۱۶۰ میلی گرم استامینوفن، ۱ میلی گرم کلرفیرامین مالتات، ۵ میلی گرم دکسترومتورفان، هیدروبروماید و ۲/۵ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید می باشد.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

### راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- در صورت سایقه حساسیت به استامینوفن، کلرفیرامین، دکسترومتورفان، فنیل افرین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله آسم، سرفه خلط دار، آمنیزیم، برونشیت مزمن، دیابت، بزرگی بروستات، گلوكوم، بیماری قلبی عروقی، پرساری خون، پرکاری تیروئید، بیماریهای کبدی و نارسایی کلیوی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی کولیتیزیک، داروهای ضد افسردگی، داروهای پائین آورنده فشار خون، داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی، داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز (MAO)، آمیودارون، فلوكستین، کیندین و فرااورده های حاوی الکل.

### صرف در بارداری و شیردهی :

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحیت پزشک متخصص.

### هشدارها :

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید.

- همzمان با این دارو از مصرف سایر فرآورده های حاوی استامینوفن خودداری شود.

- به منظور کاهش تحریک گوارشی دارو را با آب، شیر یا غذا مصرف کنید.