

# دی سیکلومین ۱۰

فرص روکشدار

## مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار

مصرف معمول این دارو بصورت زیر می باشد :

- بزرگسالان : ۱۰ میلی گرم ۳ یا ۴ بار در روز

- کودکان ۶ سال به بالا : ۱۰ میلی گرم ۳ یا ۴ بار در روز

## عوارض جانبی :

هر دارو به مواراز اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد لیکن در صورت هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید :

خشکی دهان، بینی، گلو یا پوست، تهوع، استفراغ، یبوست، درد معده، نفخ، کم شدن اشتها، سردرد، خواب آلودگی، تاری دید، دو بینی، سرگچه، افزایش حساسیت چشم به نور، فراموشی، گیجی، توهه، اضطراب، خستگی مفرط، تپش قلب، راش یبوستی، خارش و کهیر.

## مسنومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمایند.

## شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

## راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.

- در صورت سایقه حساسیت به دی سیکلومین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظه و ماده رنگی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی اسید، داروهای ضد اسهال جنبی، داروهای آنتی کولینرژیک، تکتوکونازول، کلورورپتاسیم، داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی، داروهای آنتی هیستامین، داروهای خواب آور و آرام بخش.

- در صورت ابتلاء یا سایقه ابتلاء به هر نوع بیماری از جمله گلوکوم، کولیت زخمی، بزرگی پروساتات، اشکال در دفع ادرار، سوزش سر دل، پرفشاری خون، پرکاری تیروئید، نارسایی های قلبی، بیماری های کبدی و کلیوی.

## صرف در بارداری و شیردهی :

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

## هشدارها :

- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نموده و کمتر یا بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف ننمایید.

- قبل از هر عمل جراحی به پزشک یا دندانپزشک خود اطلاع دهید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و تاری دید گردد لذا خصم درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

- در صورت فعالیت بدنسی یا گرمی هوا، احتیاط کنید زیرا ممکن است درجه حرارت بدن افزایش یابد.

- سالماندان نسبت به عوارض این دارو حساس ترند.

- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن آنرا مصرف کنید. اما اگر زمان نوبت بعدی رسیده است، از مصرف آن نوبت رساندن رفتنظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز برابر نکنید.



شرکت داروسازی امین  
ایران - اصفهان