

# گاباپتین

کپسول ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و با توصیه به دیگران خودداری فرمائید.

## راهنماییهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو، در مواد زیر با پژوهش خود مشورت کنید :

- در صورت ساقمه حساسیت به هر نوع دارو از جمله گاباپتین یا هر نوع غذا، ماده حافظه و ماده رنگی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای خسد تشنج، داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی، داروهای آنتی اسید، مرفین و تاپروکسن.

- در صورت ساقمه یا ایجاد هر نوع بیماری از جمله بیماری کلیوی.

## صرف در یاراداری و شیردهی:

سازارداری: در انسان مطالعات کافی انجام نشده است و فقط زمانی در مادران باردار تجویز شود که اثرات سودمند دارو بر مضرات آن ارجحیت داشته باشد.

شیردهی: در مورد ترشح این دارو شیر مادر و اثمار آنس این بر روی شیرخوار اطلاع دقیق وجود ندارد لذا فقط ایسد زمانی در مادر شیرده تجویز شود که اثرات سودمند آن کمالاً واضح باشد.

## هشدارها:

- دارو را بطور مرتبت و مطابق دستور پژوهش مصرف کنید و از مصرف مقابله بیش از حد توصیه شده توسعه پژوهش خودداری نمایید.

- در صورت مشاهده افزایش دفعات تشنج، تغییرات بیانی و کسودی و یا خونریزی غیر معمول با پژوهش خود مشورت نمایید.

- از انجایی که این دارو ایجاد تاری دید و خواب آلودگی و گیجی مینماید از رانندگی و کار با ماشین آلتی که یاز به هوشیاری کامی دارد بپرهیزید.

- مصرف دارو را به طور ناگهانی و بدون دستور پژوهش قطع ننمایید.

- در صورتی که کس نویت مصرف دارو را اضافه کردید سه مخفی به ساده از آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً یک ساعت مصرف نویت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف این خودداری و مقابله مصرف بذری را بین ۵ تا ۱۰ برابر نکنید.

- دوز تجویز شده توسعه پژوهش را معرف نموده و از تغییرات نویز خودداری نمایید.

- از مصرف غمزمان داروهای آنتی اسید این دارو خودداری کنید و در صورت نیاز به مصرف همزنان، داروی آنتی اسید را حداقل دو ساعت قبل از گاباپتین مصرف کنید.

- در صورت دیپس ناشستن هر نوع عمل جراحی مانند جراحی دندان، پژوهش کیا دندانپزشک خود را از مصرف این دارو مطلع کنید.

- در صورت نیاز به هر گونه تست آزمایشگاهی پژوهش و پرسنل آزمایشگاه را از مصرف این دارو مطلع کنید.

## مقادیر و نحوه مصرف دارو:

### بزرگسالان

حد تنشی ۳۰۰: میلی گرم ۳ بار در روز.

- دوز دارو را تدریجی تا حدکسر ۳۶۰۰ میلی گرم در روز تا حصول پاسخ درمانی متوان افزایش داد. زمانی که بیمار سه بار در روز دارو را مصرف کند، حدکسر فاصله بین دو دوز ۱۲ ساعت باشد.



شرکت داروسازی امین  
ایران - اصفهان

درمان نورالرئی: ۳۰۰ میلی گرم بصورت تک دوز در روز اول، ۶۰۰ میلی گرم در روز دوم و ۹۰۰ میلی گرم در روز سوم.

- حدکسر دوز ۱۸۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

- درمان در نوروباتی محیطی ناشی از دیابت: ۹۰۰ میلی گرم در روز.

- حدکسر دوز ۳۶۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

اطفال:

حد تنشی: ۱۲ - ۳ سال: ۱۰-۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در ۳

دوز منقص

المندان: از حد تنشی: دوز دارو بر اساس کلیرانس کتابتین تعین می شود.

درمان نورالرئی: ۳۰۰ میلی گرم بصورت تک دوز در روز اول، ۶۰۰ میلی گرم در روز دوم و ۹۰۰ میلی گرم در روز سوم.

- حدکسر دوز ۱۸۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

عارض جانبی:

هر دارو به موارد اشتراط درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برقخی عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه تمام این عوارض فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز مراحت هر یک از عوارض زیر با پژوهش خود مشورت کنید:

شایع: ناتوانی در کنترل حرکت اعصابی بدن و چشمها.

کمتر شایع: فراموشی، تحریک بذینیزی، تقبیس در خلق و خسرو، درد دست و پا و لکوپنی.

سایر عوارض در صورت بروز نیاز به توجه برقخی شناسی دارند و در طی دوره درمان با اتفاقیات بدن بما دارو رفع می شوند اما بین وجود در صورت ادامه هر کدام از این عوارض یا ادامه مراحت آنها با پژوهش خود مشورت کنید:

شایع: افکار غیر عادی، ضعف، اسهال، گیجی، خستگی، تدبیر، عقوبات، درد عضلانی،

تورم، گیجی، لرزش، اختلالات بینایی شامل دوینی و تاری دید.

کمتر شایع: افزایش لوز و اشتها، کسر درد، تکرار ادرار، بیوست، اسهال، سردرد ناتوانی کسری، سرفه، اختلال در تفکر و تمرک.

متوجه شوند:

علاء مسمومیت سطح اسفل اسحال شدید، دوینی، گیجی، خواب آلودگی و اختلال تکلم می باشد.

هیچ آنتی دوت اختصاصی برای درمان مسمومیت این دارو وجود ندارد. درمان

اختصاصی همودیالیز (به خصوص در افراد مبتلا به نارسایی کلیه) است. سایر اقسامات حمامیتی نیز بر حسب نیاز اعتماد می شود.

شوابی نگهداری:

- دارو را دور از سترمن اطفال نگهداری کنید.

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

- به تاریخ افتتاحی قسط شده روی جعبه دارو توجه و از مصرف داروی تاریخ گذشته

چنان خودداری نمایید.