

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار و نحوه مصرف هر دارو توسط پزشک معالج تعیین می شود. ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است :

بزرگسالان : وزن اند $\frac{4}{3}$ کپسول در دوز منقصم.

کودکان : میزان مصرف این دارو در کودکان تعیین نشده است.

عوارض جانبی :

هر دارو به مواراث اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز مزاحمت هر یک از عوارض زیر با پزشک خود معرفت کنید :

عوارض نادر : آنی یا لوکپنی (سرقه و گرفتگی صدا، تب یا لرز، درد

پشت یا پهلو، احساس درد به هنگام دفع ادرار)، سنتگ صفرها (درد شدید معده همراه با تهوع و استفراغ)، میوزیتیس (در دعاضلانی، خصف یا خستگی غیر طبیعی).

عوارض کمتر نادر : در صورت ادامه نیاز به توجه پزشکی دارند :

عوارض شایع : درد، گاز و سوزش معده.

عوارض کمتر شایع : اسهال، تهوع با استفراغ، بثورات پوستی و خستگی غیر معمول.

ممومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از 30°C درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

- به تاریخ انقضای قید شده روی جعبه دارو توجه و از مصرف داروی

تاریخ گذشته جدا خودداری کنید.



شرکت داروی امین
ایران - اصفهان

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- در صورت ساقمه حساسیت به این دارو یا هر یک از داروهای مشابه نظیر کافپیرات، یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد عقاید خون و لواستین.

- در صورت ابتلاء به هر نوع بیماری از جمله سیروز صفوای، سنتگ های صفوایی، نارسایی کبدی و کلیوای.

صرف در بارداری و شیردهی :

با توجه به اینکه در مورد اثرات این دارو در دوران بارداری و شیردهی مطالعات کافی صورت نگرفته است، مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی مگر در صورت صلاحیت پزشک متخصص توصیه نمی شود.

هشدارها :

- دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف نمایند و از افزایش یا کاهش و یا قطع خودسازه دارو خودداری نمایند.

- درمان تحت نظر پزشک معالج و با کنترل های پزشکی لازم مانند بررسی تیزیات آنژیمهاهای کبدی، کراتین کیتان، لاكتات دهیدروژناز، پاتسیمی خون، شمارش لکوسیتیها، هموگلوبین، هماتوکریت و میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون صورت گیرد.

- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به بیاد آوردن آن را مصرف نکنید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرازیسده باشد از مصرف آن نوبت خودداری کده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- دارو را در دو نوبت صبح و عصر نیم ساعت قبل از غذا میل نمایید.

- مصرف این دارو در کودکان زیر 2 سال توصیه نمی شود.

- به مغطر بروزی پیشرفت درمان بطور منظم با پزشک در تماس باشید.

- رعایت رژیم غذایی همان میزان با مصرف این دارو توصیه می شود.

- در صورت تغییر ناگهانی عملکرد کبدی و بروز ضعف عضلانی، قطع مصرف دارو توصیه می شود.

- پس از قطع دارو، رژیم مناسب کم چربی و بروزی آزمایشگاهی چربی خون تا زمان بهسودی و ضعیت بیمار توصیه می شود چرا که گاهی

قطع دارو منجر به افزایش ناگهانی چربی خون می شود.