



ایمی پرامین

قرص روکشدار ۱۰ و ۲۵ میلی گرمی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت سابقه حساسیت نسبت به ضد افسردگی های سه حلقه ای، مایروتین یا تراادون، هر نوع غذا یا رنگ خوراکی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد پرکاری تیروئید، تضعیف کننده های سیستم عصبی مرکزی، ساهمتیدین، کلونیدین، گوانتیدین، داروهای مهار کننده آنزیم منوآمینو اکسیداز، داروهای مقلد سمپاتیک، فنوتیازین ها.
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری مثل آسم، بیماران مایک دپرسیو، تشنج، مشکلات ادراری، بیماری قلبی - عروقی؛ اختلالات خونی، اختلالات گوارشی، گلوکوم، نارسانای عملکرد کبد و کلیه، پرکاری تیروئید، هیپرتروفی پروستات، اسکیزوفرنی.

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع می باشد مگر با صلاحیت پزشک.

هشدارها :

- دوره درمان با این دارو را کامل کنید و مقدار مصرف آن را تغییر ندهید.
- شاید بین ۶-۱ هفته زمان نیاز باشد تا دارو اثر درمانی خود را بروز دهد بنابراین در ابتدای مصرف آنرا قطع نکنید.
- قبل از انجام تستهای آزمایشگاهی و یا اعمال جراحی و دندانپزشکی پزشک را از مصرف دارو مطلع سازید.
- در صورت ایجاد حساسیت به نور خورشید از کرم ضد آفتاب و لباسهایی با پوشش کامل استفاده کنید و حتی المقدور در معرض نور خورشید قرار نگیرید.
- با توجه به اثر خواب آلودگی دارو از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند مثل رانندگی بپرهیزید.
- در صورتیکه دارو را به طور منظم مصرف می کنید و شما یک نوبت دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را دو برابر نکنید. در صورتی که نحوه مصرف دارو یک نوبت موقع خواب باشد، از مصرف نوبت فراموش شده در صبح خودداری نمایید و با پزشک مشورت نمایید.
- در صورت ایجاد خشکی دهان از آب نبات و آدامس بدون شکر استفاده کنید و اگر بیش از ۲ هفته ادامه یافت به پزشک مراجعه نمایید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار دقیق مصرف را پزشک تعیین می نماید اما به طور معمول بصورت زیر تجویز می شود:

بعنوان داروی ضد افسردگی :

- در بزرگسالان: ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم ۳ یا ۴ بار در روز تا حداکثر ۲۰۰ میلی گرم در روز.
- در بچه های ۱۲-۱۰ سال: ۳۰-۱۰ میلی گرم در ۲ دوز منقسم در روز.
- در موارد شب ادراری برای بچه های بالای ۶ سال ۲۵ میلی گرم یک ساعت قبل از خواب توصیه می شود. اگر بعد از یک هفته بهبودی ایجاد نشد برای کودکان تا ۱۲ سال ۵۰ میلی گرم و بالای ۱۲ سال ۷۵ میلی گرم هر شب توصیه می شود.

عوارض جانبی دارو :

هر دارو به موارات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز مزاحمت هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

تاری دید، گیجی، ایجاد مشکلات در بلع یا صحبت کردن، درد چشم، نا منظمی ضربان قلب، تهوع، بهم خوردن تعادل، ماسک شدن صورت، ایجاد مشکلات ادراری، سستی عضلات بازو و ران، بزرگ شدن سینه ها، ریزش مو، ترشح شیر در بانوان، ایجاد حساسیت به نور، تشنج، راشهای پوستی، تب، ضعف عضلات صورت و زبان، زردی چشم و پوست، یبوست، اختلالات خونی، کاهش فشار، ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری، خشکی دهان، ضعف و بی حالی، سر درد، افزایش اشتها، تهوع، خستگی، افزایش وزن، اسهال، افزایش تعریق، استفراغ، کاهش فشار وضعیتی.

مسمومیت :

در صورت بروز مسمومیت، بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

