

کیدی کلد®

شربت سماخوردنگی کودکان

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه در اغلب بیماران عارضه چندانی بروز نکرده و با عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو رفع می شوند، با این حال در صورت بروز بعضی از عوارض و ادامه یا تشدید آنها با پزشک مشورت کنید.

عوارضی که نیاز به توجه پزشک دارند:

خواب آلودگی، تب، گلودرد، خستگی و ضعف، نامنظم بودن ضربان قلب، تغیرات روحی،
عوارضی که در صورت تداوم با ادامه یافتن نیاز به توجه پزشکی دارند:
خواب آلودگی، غلیظ شدن ترشحات برونیش ها، تاری دید، اشکال در ادرار کردن یا ادرار کردن دردناک، سرگیجه، خشکی دهان، بینی و گلو، سردد، کاهش اشتتها، وزوز گوش، دانه های پوستی، بیقراری و تحریک پذیری.

سمومیت :

در صورت بروز مسمومیت، کودک را به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نسور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخ زدگی محافظت نمایید.
- به تاریخ انقضای قید شده روی جعبه دارو توجه و از مصرف داروی تاریخ گذشته جداً خودداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

این دارو برای بیماری فعلی کودک شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت سایقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ یا ماده رنگی.
- در صورت ابتلا کودک به آسم، گلوكسوم، زیادی فشارخون، بیماری قلبی، دیابت، بیماری تیروئید، اشکال در دفع ادرار
- در صورت مصرف هر نوع دارو.

هشدارها :

- مصرف این دارو به مدت بیش از ۷ روز توصیه نمی شود.

- مصرف این دارو در بعضی کودکان موجب بروز بیقراری یا تحریک پذیری و گاهی گیجی، خواب آلودگی و کاهش هوشیاری می شود.

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده به کودک ندهید.
- در صورت تداوم علائم بیماری یا بروز علائم جدید به پزشک مراجعه کنید.

- در صورت بروز تحریکات گوارشی، دارو همراه آب، شیر یا بعاد غذا مصرف نمود.

- در صورت فراشوش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض یادآوری آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را دو برابر نکنید.

مقدار و نحوه مصرف :

- کودکان ۶-۱۲ ساله: ۲ قاشق مریاخوری، هر ۳ تا ۴ ساعت

- کودکان ۱-۶ ساله: ۱ قاشق مریاخوری، هر ۳ تا ۴ ساعت

- کودکان زیر یکسال: ۱/۲ قاشق مریاخوری، هر ۳ تا ۴ ساعت