

- از منجمد نمودن دارو خودداری کنید.
- بعد از باز کردن در ظرف و قرار دادن قطره چکان بر روی آن، دارو به مدت یک ماه قابل مصرف می باشد.

#### مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پژشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو بصورت زیر می باشد:

- نوزادان کمتر از ۶ ماه: ۱۰-۱۵ قطره ۴ بار در روز ۱۵ دقیقه قبل از غذا
- نوزادان ۶-۱۲ ماه: ۱۰-۲۰ قطره ۴ بار در روز ۱۵ دقیقه قبل از غذا
- کودکان بالای ۱ سال: ۲۰ قطره ۴ بار در روز ۱۵ دقیقه قبل از غذا

#### موارد منع مصرف :

استفاده از این دارو مورد منع مصرف خاصی ندارد.

#### تدخالت دارویی :

تاکنون تداخلات دارویی خاصی برای این دارو گزارش نشده است.

#### عارض جانی :

صرف صحیح این دارو عوارض جانی خاصی بدباند نداشته است، در موارد نادر ممکن است واکنشهای آلرژیک پوستی و تنفسی در اثر وجود انسان رازیانه بروز نماید.

#### شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بین زدگی محافظت نمایید.

شکل دارویی :  
شیشه های ۳۰ میلی لیتری

- ترکیب دارویی :
  - هر میلی لیتر قطره حاوی
  - ۴۰ میلی گرم دایمیتکون (فعال شده) Dimethicone
  - ۰/۰۰۵ میلی لیتر اسانس دانه شوید (Anethum graveolens)
  - ۰/۰۰۷ میلی لیتر اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare)
- می باشد.

موارد مصرف:  
ضد نفخ، باد شکن و بر طرف نمودن دردهای شکمی و کولیک در نوزادان و کودکان.  
این قطره برای تسکین علام دردناک ناشی از تجمع بیش از حد گاز در دستگاه گوارش خصوصاً در نوزادان به کار می رود.

#### موارد اختیاط :

- دارو را طبق دستور پژشک با مقداری توصیه شده مصرف نموده و از مصرف مقادیر بیش از حد دارو خودداری نمایند.
- قبل از استفاده ظرف محتوی دارو را خوب تکان دهید.
- بعد از هر بار مصرف در شیشه را محکم ببندید.
- در صورت عدم بهبود علائم کودکان و یا بذتر شدن علائم به پژشک مراجعت نمایید.
- اگر دارو را طی یک برنامه منظم مصرف می کنید چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن آنرا مصرف کنید. اما اگر زمان نوبت بعدی نزدیک است، از مصرف آن نوبت چشم پوشی کنید و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر ننگنید.