

لوتیرامین® لوتیراستام

مقدار و نحوه مصرف :
مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:
مشکلات عالیاند، دهیمنی، تب یا لرزه، سرفه یا گرفتگی صدا، کمر درد، یا درد پهلو، اشکال در دفع ادرار، عالائم سینیوزیت، گرفتگی یا آبریزش یعنی، تنگی نفس، خس خس سینیه، درد یا صرف عضلانی، سر درد، سرگیجه، گلو درد، خواب آلودگی، تورم گدد گردان، اشکال در بلع، کاهش اشتها، کاهش وزن، سوزش، خارش، عالائم رینیت و تغییرات خلق و خوش شامل بی قراری، فراموشی، اضطراب، افسردگی و عصبی بودن.

مسومومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بالاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه شود.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- قرص‌ها را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- محلول خوارکی را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بع زدگی محافظت نمایند.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان

این دارو برای بیماری فلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی :

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت سایقه حساسیت به لوتیراستام و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو.
- در صورت ابتلاء هر نوع بیماری از جمله نارسایی کلیوی.

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها :

- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیشتر یا کمتر از حد توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.
- هنگام مصرف این دارو بطور منظم به پزشک مراجعه کنید.
- بدون مشورت با پزشک داروی خود را قطع نکنید.
- در صورت خسروت قطع مصرف دارو، به منظور پیشگیری از افزایش تعداد حملات تشنجی، لوتیراستام باید به صورت تریجی قطع شود.
- چنانچه یک نویس از مصرف دارو را فراموش نمودید با پزشک خود تماس بگیرید. از مصرف دوز دو برابر دارو جهت جبران دوز فراموش شده خودداری کنید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث گیجه و خواب آلودگی گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- هرگونه تغییر در خلق و خوی و یا بروز رفتارهای تهاجمی، بسی قراری و آشفتگی را سریعاً به پزشک خود اطلاع همی.
- قبل از هر عمل جراحی به پزشک یا دندانپزشک خود اطلاع دهید.
- اینمی و اثر بخشی این دارو در کودکان زیر ۴ سال ثابت نشده است.