



لورامت[®]

شربت لوراتادین (5mg / 5ml)

مقدار و نحوه مصرف :

بزرگسالان و کودکان ۶ سال به بالا :

۱۰ میلی گرم، یک بار در روز

کودکان ۶-۲ سال : ۵ میلی گرم (۵ میلی لیتر شربت) یک بار در روز

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر یک از آن ها با پزشک مشورت نمائید.

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند :

آنفیلاکسی، (سرفه، اشکال در بلع، سرگیجه، ضربان قلب سریع، زشورات پوستی، کهیر، خارش، تورم چشم، صورت، لب ها یا زبان، ضعف یا خستگی غیر معمول، اشکال در تنفس، تنگی نفس و خس خس سینه).

عوارضی که در صورت تداوم یا مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارند :

خشکی دهان، بیینی یا گلو، تاری دید، گیجی، دفع مشکل یا دردناک ادرار، افزایش وزن یا افزایش اشتها، کاهش اشتها، افزایش تعریق، افزایش حساسیت پوست به نور خورشید، زنگ زدن یا همهمه در گوش و درد معده.

مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد دارو، سریعاً به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه شود.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به لوراتادین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی

- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله نارسایی های کبدی و کلیوی، بزرگی پروستات، انسداد گردن مثانه، گلوکوم و مستعد به احتباس ادرار.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی کولینرژیک، مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (مانند فوراژولیدون و پروکاربازین)، الکل و سایر داروهای تضعف سیستم عصبی مرکزی.

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحدید پزشک متخصص.

هشدارها :

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.

- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به محض بیدار شدن، دارو را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- این دارو ممکن است با آزمون های پوستی با استفاده از آلرژنها تداخل نماید لذا دارو را ۷ روز قبل از هر آزمون پوستی قطع نمائید.

- در صورتیکه خشکی دهان بیش از دو هفته ادامه داشت به پزشک یا دندانپزشک مراجعه کنید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

- در طول درمان از مصرف فرآورده های حاوی الکل یا سایر داروهای تضعف سیستم عصبی مرکزی خودداری کنید.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان

