

نور تریپتیلین

قرص روکشدار ۱۰ و ۲۵ میلی گرم

- در صورت نیاز به هر نوع عمل جراحی (از جمله جراحی دندان) و یا درمان اضطراری پزشک را از دارویی که مصرف می کنید آگاه سازید.
- برای بررسی پیشرفت درمان بطور منظم به پزشک مراجعه کنید.
- موارد اختیاط ذکر شده را ۳۱ تا ۷ روز پس از قطعی مصرف دارو نیز در نظر داشته باشید.
- کودکان و سالخوردگان نسبت به عوارض دارو حساس تر هستند.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند.

عارض جانی:

هر دارو به عوازم اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث سروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو رفع می شود با این حال در صورت برخور دارو یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید.

عارض جانی که در طی مصرف دارو دیده می شود گیجی، خواب آلودگی، خستگی، ضعف، سر درد، خشکی هدا، افزایش وزن، احساس طمم نامطبوع، تاری دید، بیوسوت، درد چشم، از حال رفتن، ضربان نامنظم قلب، عصبانیت، اشکال در به خواب رفتن، اختمام ادرار.

مسومیت:

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسومین منتقل نمایید.

از وادر کردن بیمار به استفراغ کردن خودداری کنید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی:

- قبیل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سایقه حساسیت به نوع دارو، غذا ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت اشغال به بیماریهایی نظیر آسم، بیماریهای قلب و عروق، فشار خون، تشنج، اشکال در ادرار کردن، بیزگی بروستات، آب سیاه، بیماریهای کبدی و کلیوی، گوارشی و پر کاری تیروئید.

- در صورت مصرف هم‌مان هر نوع دارو از جمله داروهای ضد آسم، سرماخوردگی، داروهای آرام بخش، ضد تشنج، ضد تب و سایمیدین.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری و شیردهی فقط با صلاحیت پزشک مصرف شود.

هشدارها:

- دارو را پیشتر یا کمتر از مقدار مقدار تجویز شده مصرف نکنید.

- برای کاهش تحریکات گوارشی دارو را همراه غذا مصرف کنید.

- نتایج مطلوب درمانی ممکن است دو تا شش هفته پس از شروع درمان ظاهر شوند.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، اگر دارو را یکبار در روز و قبیل از خواب مصرف می کنید، دارو را صبح روز بعد مصرف نکنید (به علت برخور عوارض جانی) و حتماً با پزشک خود مشورت کنید. در صورتیکه دارو را بیش از یکبار در روز مصرف می کنید مقادیر فراموش شده را به محض به یاد آوردن مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی رسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار بعدی را نیز دو برابر نکنید و مطابق با برنامه همیشگی خود دارو را مصرف کنید.

- هنگام تغییر ناگهانی وضعیت از حالت خواهید یا نشسته به ایستاده احتیاط کنید.

- احتیال سروز خواب آلودگی با مصرف این دارو وجود دارد لذا هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که به هوشیاری کامل نیاز دارد احتیاط کنید.

- قبل از قطعی مصرف دارو یا کاهش مقدار آن حتماً به پزشک مراجعه کنید. زیرا ممکن است کاهش تدریجی مقدار مصرف دارو مورد نیاز باشد.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان