



# افلوفاکت®

## افلوکساسین

قرص روکشدار ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

### راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید  
- در صورت سابقه حساسیت به افلوکساسین یا سایر آنتی بیوتیکهای گروه کینولون و فلوروکینون و یا هر نوع دارو، غذای، ماده محافظ و رنگی.  
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله وارفارین، داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، اریترومايسين، آنتی اسیدهای حاوی کلسیم، منیزیم یا آلومینیوم، فروس سولفات، روی و تنوفیلین.  
- در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به هر نوع بیماری از جمله تشنج، تصلب شریانی مغزی و نارسایی کبدی و کلیوی.

### مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

### هشدارها:

- دارو را در فواصل زمانی مشخص مصرف ننمائید.  
- دوره درمان را کامل کنید، حتی اگر بعد از چند روز احساس بهبود نمودید.  
- دارو را همراه با یک لیوان پر از آب مصرف کنید و در طول روز نیز آب زیاد بنوشید.  
- در صورت عدم بهبود علائم پس از چند روز یا بدتر شدن آنها با پزشک مشورت نمائید.

- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید، به محض به یادآوردن آنرا مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن خودداری کنید و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- در صورت مصرف همزمان داروهای آنتی اسید، سوکرافیت و مکملهای حاوی آهن یا روی، افلوکساسین را ۲ ساعت قبل و یا ۲ ساعت بعد از این داروها مصرف کنید.

- احتمال بروز واکنشهای حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد لذا از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری کرده و از فرآورده های ضد آفتاب و پوشش کامل استفاده کنید.

- از آنجا که افلوکساسین پوست را به نور خورشید حساس میکند در صورت قرمزی پوست، راش پوستی و یا سایر علائم حساسیتی دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.

- مصرف این دارو ممکن است ایجاد حالت گیجی و خواب آلودگی نماید لذا هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند احتیاط نمائید.

- در صورت احساس درد، تورم و التهاب تاندون یا ضعف و ناتوانی در استفاده از مفاصل سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید. افراد مسن بالاتر از

۶۰ سال نسبت به این عارضه حساسترند.

- مصرف افلوکساسین ممکن است با نورپاتی محیطی همراه باشد. اگر علائم نورپاتی محیطی چون درد، بی حسی، احساس سوزش بروز نمود سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.

- در بیماران دیابتیک که انسولین یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون مصرف مینمایند، در صورت بروز واکنش هیپوگلیسمیک دارو را قطع و با پزشک خود مشورت نمائید.

- مصرف افلوکساسین در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

### مقدار و نحوه مصرف:

بزرگسالان:

- درمان برونشی، برونشیت مزمن و عفونت های پوستی:

۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۰ روز

- درمان سوزاک بدون عارضه:

۴۰۰ میلی گرم بصورت دوز منفرّد

- بیماری التهابی لگن:

۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز

- درمان التهاب پروستات:

۳۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۶ هفته

- عفونت مجاری ادراری:

۲۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۳ تا ۱۰ روز (با توجه به عامل بیماری زا)

### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:

درد قفسه سینه، افزایش فشار خون، تورم صورت و دست و پا، کولیت سودومیران، واکنش های حساسیتی و عوارض پوستی، اشکال در بلع و تنفس، تهوع، استفراغ، اسهال، دل درد، نفخ، بیوست، احساس سوزش در معده، خشکی دهان، بی اشتها، سردرد، بی خوابی، سر گیجه، خستگی، عصبانیت، تشنج و عوارض دستگاه ادراری-تناسلی (خارش، سوزش، درد).

### مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمائید.

### شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.



شرکت داروسازی امین  
ایران - اصفهان

