

ف Nobar Biyetal

قرصان ۱۵ و ۱۰۰ میلی گرم

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می نماید ولی مقدار مصرف معمول آن بصورت زیر می باشد :

بزرگسالان :

- ضد شنج : ۶۰ تا ۲۵۰ میلی گرم در روز بصورت مقدار واحد یا در دوز منقصم،
- خواب اور : ۱۰۰ تا ۳۳۰ میلی گرم هنگام خواب
- تسکین بخش : ۳۰ تا ۱۲۰ میلی گرم در دو یا سه دوز منقصم در روز.
- کودکان :

کودکان :

- ضد شنج : ۱-۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت مقدار واحد یا در دوز منقصم،
- خواب اور : باید برای هر بیمار بطور جداگانه توسعه پزشک تعیین گردد.
- تسکین بخش : ۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سه بار در روز
- تسکین بخش پیش از عمل جراحی : ۱ تا ۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد در صورت بروز هر کدام با پزشک مشورت کنید.

عوارض که نیاز به توجه پزشکی دارند :

افسردگی روانی بخصوص در سالمندان یا بیماران ناتوان، هیجانات غیر عادی بخصوص در کودکان، سالمندان یا بیماران ناتوان، گلو درد و یا تب، بشورات پوستی، تورم بالکه، صورت یا لبه، خستگی یا ضعف غیر عادی، زخم‌های خونریزی دهنده روی لبه، خونریزی یا کبودی غیرعادی، درد قفسه سینه.

عوارض که در صورت تداوم یا مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارند :

از دست دادن مهارت در انجام کار یا عدم بینای، سرگیجه یا منگی، خواب آلودگی، اضطراب، بیوسیت، احساس از حال رفت، سر درد، تهوع یا استفراغ، کابوس یا اشکال در به خواب رفتن.

مسومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.



شرکت داروپسای اینی
ایران - اصفهان

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد متابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نماید.

راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایند.

- در صورت سایقه حساسیت به فنوباربیتال یا هر نوع دارو غذا، ماده رنگی و ماده محافظ.

- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری نظری کم خونی شدید، سابقه آسم، انفیزیم، تراحتیهای تتفشی، دیابت ملتوس، پیش فالی در پچه ها، افسردگی، پرکاری تیروئید، پورفیریا، بیماری کلیسوی، کبدی، قلبی، درد، کم کاری غده اдрنالن.

- در صورت مصرف هرگونه دارو از جمله داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی، کورتیکواستروئیدها، داروهای ضد انتقام، کاربامازین، والبروتیک اسید، داروهای کتراسپتیو حاوی استروژن.

صرف در بارداری و شیردهی :

این دارو به هیچ وجه در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحیت پزشک متخصص.

هشدارها :

- بدليل احتمال بروز ایستگی این دارو را تنها مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.

- در صورتی که بعد از چند هفته مصرف دارو، پیشریختی در وضعیت شما به وجود نیامده مقدار مصرف دارو را افزایش ننده و با پزشک خود مشورت کنید.

- در صورتی که دارو را به عنوان یک داروی ضد صرع مصرف میکنید دارو را هر روز و در فواصل زمانی منظم مصرف کنید.

- اگر دارو را برای مدت طولانی مصرف می کنید جهت بررسی پیشرفت درمان بطور منظم به پزشک مراجعه کنید.

- در صورتی که یک نوبت دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن مصرف کنید ولی اگر تقیباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را دو برابر نکنید.

- قبل از مشورت با پزشک دارو را قطع نکنید چرا که ممکن است پزشک شما بخواهد قبل از قطع کامل دارو مقدار دارو را بتربیط کاهش دهد.

- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی گردد لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، پرهیزد.

- در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد بارداری خواکی حاوی استروژن از روشهای دیگر پیشگیری از بارداری استفاده کنید.