

# پرگاسول®

پرگابالین

پکسول ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ میلی گرمی

- پرگابالین ممکن است باعث تاری دید و تغییراتی در بینانی شما شود لذا در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت دید خود سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.

- هرگونه تغییر رفتار نظری رفتار تهاجمی، بی قراری و آشفتگی را سریعاً به پزشک اطلاع دهید.

- بدون دستور پزشک داروی خود را قطع ننماید و یا دوز آن را کاهش ندهید.

## مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند ولی دوز معمول این دارو ۱۵۰ الی ۶۰۰ میلی گرم در روز در دو یا سه دوز منقسم می باشد.

## عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض اتفاق افتاد لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:

تنگی تنفس، خس خس، درد قفسه سینه، تاری دید، دو یعنی یا تغییرات دیگر در بینانی، کمیر، خارش، تاول، تورم صورت، چشم، گلو و دهان، خستگی، سرگیجه، سر درد، خشکی دهان، فراموشی، تهموع، اسقراخ، بیوست، نفخ، اضطراب، عدم تعادل، افزایش اشتہا، افزایش وزن، کمر درد.

## مسومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار را سریعاً به بیمارستان مسومین منتقل نماید.

## شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.



شرکت داروسازی امین  
ایران - اصفهان

## راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.

- در صورت ساقیه حساسیت به این دارو یا هر نوع دارو از جمله باربیتوواتها و سایر داروهای ضد تشنیج، هرگونه غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای کاهنده فشار خون، داروهای ضد افسردگی، آنتی هیستامینها، داروهای ضد اضطراب، داروهای ضد تشنیج، داروهای ضد تب مانند بیولکاتازون، داروهای ارام بخش، داروهای روان گردان، داروهای ضد درد چون اکسی کافون و فرازوردهای حاوی الکل.

- در صورت ابتلا یا ساقیه ابتلا به هر نوع بیماری از جمله نارسایی احتقانی قلب، بیماریهای کلیوی، مشکلات خونری، دیابت و افسردگی.

## صرف در بارداری و شیردهی :

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

## هشدارها :

- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید.

- در صورت ابتلا به دیابت، در طول مصرف پرگابالین توجه بیشتری به بیوست خود نموده و در صورت بروز قرمزی، زخم و سایر مشکلات پوستی سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.

- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودیده به محفوظ به یاد آوردن آن را مصرف کنید. اما اگر زمان نوبت بعدی رسیده است، از مصرف آن نوبت چشم پوشی کنید و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- این دارو ایجاد حالت گیجی و خواب آلودگی می کند لذا هنگام رانندگی یا کار با لوازمی که نیاز به هوشیاری کامل دارند دقت نمایید.

- در صورت داشتن هرگونه عمل جراحی از جمله جراحی دندان، پزشک خود را از مصرف این دارو آگاه سازید.

- ایمنی مصرف این دارو در کودکان زیر ۱۸ سال ثابت شده است.

- دارو را هر روز در زمان مشخص مصرف نمایید تا اثربخشی دارو بیشتر گردد.