

سرامین® کوتایپس

- مصرف این دارو اختلال خطر افت فشار خون و ضعیتی را به همراه دارد. لذا ضمن درمان از تبییر وضعیت سریع از حالت خوبیده به نشسته و ایستاده خودداری کنید.

- کوتایپس باعث میشود که بدن شما هنگامی که در شرایط گرم آب و هوایی قرار میگیرد تواند خود را خنک کند. در طی مصرف این دارو از انجام روشاهی سخت پرهیزید. در حد امکان در منزل بمانید لباس کم پوشید و مقدار کافی مایعات بنوشید تا از بروز دهیدراتاسیون جلوگیری شود.

- این دارو میتواند با غذا یا بدون غذا میل شود.

- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن آنرا مصرف کنید. اما اگر زمان نوبت بعدی رسیده است، از مصرف آن نوبت چشم پوشی کنید و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف دارو را پژشک تعیین میکند ولی بطور معمول دارو با ۲۵ میلی گرم دو بار در روز شروع شده و با نظر پژشک متخصص وزانه به ۳۰۰-۴۰۰ میلی گرم در ۲ یا ۳ بار منقسم افزایش میباشد.

عواراض جانبی :

هر دارو به مواد اشراث مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمیافتد

لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پژشک خود مشورت کنید:

اختلال در صحبت کردن، اشکال در تنفس و بلع، کاهش کنترل تعادل، سندروم شبه افغولنازی، تاب، گلودرد، سرگیجه، تورم پاهای، افت فشار خون، نامنظمی عادت ماهیانه، تاکی کاردی، بیوست، خواب آلودگی، خشکی دهان، سوء هاضمه، افزایش وزن، دردهای شکمی، دید غیر معمول، کاهش اشتیه، ضعف، سر درد و ریخت.

ممومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را دور از نور و رطوبت و در مای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان

فرص روکشدار خط دار ۲۵ و ۱۰۰ میلی گرمی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پژشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله سامندهای، لودویا، دوبامین، الکل، داروهای خسد فشار خون، داروهای مضعنف سیستم اعصاب مرکزی، مهار کننده های آنزیم سیتوکروم P450A مانند دیلتیازم، اریتروماسین، فلوکونازول، ایتراکونازول و کوکونازول، القا کننده های آنزیم های کبدی سیتوکروم P450 مانند فنی توئین و کاربامازپین.

- در صورت سابقه ابتلا به هر نوع بیماری خصوصاً بیماریهای کلیوی، کبدی، بیماریهای قلبی - عروقی، بیماری‌ای ازایمیر، سایه سلطان سینه، سابقه بیماری های عروق غزی و از دست دادن آب بدن یا کاهش حجم خون.

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحیت پژشک متخصص.

هشدارها :

- دارو را مطابق دستور پژشک مصرف نمایید.

- دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پژشک مصرف نکنید.

- این دارو به تکریل عالمند شما کمک میکند ولی آن را درمان نمیکند. چندین هفته طول میکشد تا افrixishi کوتایپس در تکریل عالمند بیماری شما ظاهر شود.

- از قطع ناگهانی دارو بدون مشورت با پژشکتان خودداری کنید. حتی در صورت احساس بهبودی مصرف دارو را ادامه داده و آن را قطع نکنید.

- قبیل از هر عمل جراحی به پژشک با دندانپزشک خود اطلاع دهید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث گیجی و خواب آلودگی شود لذا هنگام رانندگی و کار با ماشین الات و وسائلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند احتیاط نمائید.

- از مصرف هم زمان دارو با فرآورده های الکلی خودداری کنید.