

## قرص سوپرا کلد - دی®

- مصرف این دارو ممکن است باعث گیجی و خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان از راندنگی و کار با سایلی که نیاز به هوشواری کامل دارد پرهیزید.
- در صورت در پیش داشتن هر نوع عمل جراحی با پزشک یا دندانپزشک خود تماس بگیرید.
- چنانچه داروهای خست‌افسردگی یا داروهای اعصاب و روان و یا داروهای خست پارکینسون مصرف می‌نمایید، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت عدم پهلوه عالم بیماری با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

### مقدار و نحوه مصرف :

در صورت تجویز پزشک طبق دستور پزشک مصرف شود. ولی بطوط معمول مقدار مصرف این دارو ۱-۲ قرص هر ساعت می‌باشد (در صورت بروز خواب آلودگی شدید شب ها ۱-۲ قرص قبل از خواب مصرف شود).

### عارضات جانبی :

هر دارو به موارد اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، ولی در صورت بروز مراحت هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت کنید.  
عارضی که در صورت بروز نیاز به توجه پزشکی دارند:

- تشنگ، توهه، خربیان نامنظم قلب، تنگی نفس یا اشکال در تنفس، بسروات پوستی، کهیز یا خارش، شکروت ادرار، ضفت یا خشکی غیر عادی، هیاتست (زد شدن پوست یا ششمها)

عارضی که در صورت تداوم یا مراحت نیاز به توجه پزشکی دارند:

- عصبانیت، بسی قراری، اشکال در به خواب رفتن، خواب آلودگی، خشکی دهان، بینی یا گلو، دردهای تاری دید، اغتشاش شعر و غلظت شدن تریخات موکوسی

### مسوومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسحومین منتقل کنید.

### شرایط نگهداری :

دارو را دور از نور و رطوبت و در مای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.  
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.  
به تاریخ انقضای قید شده روی جعبه دارو توجه و از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت سایقه حساسیت به استامینوف، فیل افرین، دیفن هیدرامین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت ابتلاء به سواری یا نظریه دیابت، بزرگی بروستات، انسداد مجرای ادراری یا مشواری دفع ادرار، گلوکوم، هیاتست بیماری قلسی عروقی، بد فشاری خون، بیماری کلیوی و پرکاری تیروئید.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی کولیپریتیک، داروهای خست‌افسردگی، داروهای پائین اورنده فشارخون و داروهای محکر یا تعییف کننده سیستم عصبی.

### مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود مگر با صلاحیت پزشک متخصص

### هشدارها :

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده نتوسط پزشک خودداری نمایید.
- هم‌زمان با این دارو از مصرف سایر فرآوردهای حاوی استامینوف خودداری شود.
- به منظور کاهش تحریک گوارشی دارو را آب، شیر، غذا صرف کنید.
- در صورت تراویش کدن یک نوبت مصرف دارو به محسن بیاد اوری آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی رسیده است، از آن نوبت صرف نظر کرده و مصرف دارو را طبق برنامه ممکن ادامه دهیم. از دوپر ایس کردن مقدار مصرف دارو خودداری نکنید.
- در صورت عدم پهلوه و یا تشدید علامت بیماری و یا قطع شدن تسبیب با پزشک تماس بگیرید.

مصرف این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی‌شود.

- افراد مسن نسبت به عوارض این دارو حساس ترند. عوارضی مانند گیجی، خواب آلودگی، دفع دردناک ادرار، احساس ضعف، خشکی دهان، بینی یا گلو ممکن است در بیماران مسن بیشتر اتفاقی بیفتد.



شرکت داروسازی امین  
ایران - اصفهان