

قرص سوپرا کلد[®]

استامینوفن ۳۲۵ / فیلی افرین هیدروکلراید

- در طول ۲۴ ساعت بیش از ۱۰ قرص مصرف نکنید.
- چنانچه داروهای خسد افسردگی یا داروهای اعصاب و روان و یا داروهای خسد پارکینسون مصرف می نمایید، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید.

مقدار و نحوه مصرف :

- بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال به بالا : ۱-۲ قرص هر ۴-۶ ساعت.
- در مورد مصرف دارو در کودکان زیر ۱۲ سال با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگر چه همه این عوارض اتفاق ننمی افتد در صورت بروز عوارض زیر به پزشک مراجعه کنید.

عواراضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

عوارض نادر: تنفسنگ، توهّم، ضربان نامنظم قلب، اشکال در تنفس، درماتیت آرژیک و نارسایی های کلیوی.

عواراضی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند:

بی قراری، اشکال در خواب رفتن، عصبانیت، سر درد، افزایش تعریق، تهوع و استفراغ، ضعف، اشکال در دفع ادرار

مسومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل نمائید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و دردمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای قید شده روی جعبه دارو خودداری کنید.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان

سوپراکلد، یک ترکیب ضد احتقان و مسکن است که برای تسکین موقت علاجی سینوزیت و سرماخوردگی نظیر احتقان بینی و سینوس و سر درد به کار می رود.

راهنماییهای عمومی :

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت سایه حساسیت به هر نوع دارو از جمله استامینوفن و فنیل افرین، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت ایلاتلابه هر نوع بیماری از جمله دیابت، فشارخون، پرکاری تبروئید، سایه بیماری روانی، هپاتیت یا سایر بیماریهای کبدی.

صرف در بارداری و شیردهی :

این دارو در دوران بارداری و شیردهی با توصیه و تجویز پزشک مصرف شود.

هشدارها :

- دارو را مطابق دستور مصرف نمایید. دارو را بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک یا داروساز مصرف نکنید.

- همزمان با این دارو از مصرف سایر فروآورده های حاوی استامینوفن خودداری شود.

- افاده مسن و کودکان نسبت به اثرات این دارو حساس ترند.

- در صورتیکه عالمان بیماری بهبود نیافست یا بدتر شد و در صورت وجود تب شدید با پزشک مشورت کنید.

- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت پیش از این نوبت صرف نظر کنید و مصرف دارو را طبق برنامه معمول ادامه دهید.

- در صورت داشتن هر گونه عمل جراحی در مورد مصرف این دارو با پزشک یا دندانپزشک مشورت کنید.