

ترزامین®

سیپروهپتادین

محلول خوارکی (۲ میلی گرم در ۵ میلی لیتر)

- در صورتیکه خشکی دهان بیش از دو هفته ادامه داشت به دندانپزشک مراجعه کنید.
- برای مصرف این دارو حتماً از پیمانه همراه دارو استفاده کنید.

- مصرف این دارو در افراد بالای ۶۵ سال توصیه نمی شود.
- قیل از هرگونه عمل جراحی و یا دندانپزشکی به پزشک خود اطلاع دهید.

- مصرف این دارو عوارض جانبی سیپروهپتادین را تشدید می کند.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک تعیین می کند.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در بیک فرد اتفاق ننمی افتد ولی در صورت بروز عارض زیر با پزشک مشورت نمائید.
خواب آلودگی، غلیظ شدن ترشحات نایزه، تاری دید، دفع مشکل یا دردناک ادرار، اختشاش شعور، خشکی دهان، بینی و گلو، ضربان کوبنده قلب، افزایش اشتها، زنگ زدن یا همهمه گوش، بیورات جلدی، افزایش وزن.

مسومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو، بیمار را سریعاً به بیمارستان مسومون متنقل نمایید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توجیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به سیپروهپتادین، سایر آنتی هیستامین ها یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی

- در صورت ابتلاء به هر نوع بیماری از جمله آسم، آب سیاه، بزرگی بروستات، انسداد مجرای ادرار یا دفع مشکل ادرار

- در صورت مصرف هر گونه دارو، از جمله داروهای ضد موسکارینی و داروهای خواب آور، آرام بخش، خسد اضطراب، خستگی، شل کننده های عضلانی.

صرف در بارداری و شیردهی :
این دارو در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود مگر با صلاحیت پزشک.

هشدارها :

- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید.
- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.

- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- احتمال بروز خواب آلودگی با مصرف این دارو وجود دارد. لذا هنگام رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد احتیاط کنید.

- به منظور کاهش تحریک گوارشی، دارو را همراه با غذا، آب یا شیر مصرف کنید.

- این دارو ممکن است با آزمونهای یوستی با استفاده از آرژننهای تداخل نماید. بنابراین لازم است پزشک را از مصرف این دارو مطلع کنید.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان