

تری هگزیفینیدیل

قرص ۲ و ۵ میلی گرم

- قبل از قطع مصرف دارو با پژشک مشورت کنید زیرا ممکن کاهش تدریجی
مقدار مصرف لازم باشد.

- برای بررسی پیشرفت درمان، در طول درمان طولانی مدت، بطور منظم به
پژشک مراجعه کنید.

- بیماران سالخوردۀ ممکن است نسبت به مقادار مصرف عضول بزرگ‌الان
حساست باشند.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پژشک تعیین می کند ولی به طور معمول مقدار
مصرف این دارو به صورت زیر می باشد:

- بزرگ‌السان: پارکتینسون:

روز اول مقدار ۱-۳ میلی گرم مصرف می شود و سپس هر ۳-۵ روز، ۲ میلی گرم به
مقدار مصرف افزوده شده تا تیجه مطلوب حاصل گردد، با مقدار مصرف به
۶-۱۰ میلی گرم در روز برسد. این مقادیر معمولاً در سه مقدار منقص همراه با غذا
تحمیز گردند.

و اکنتهای اکسترپرایمیال ناشی از مصرف داروها:

ابتداء ۱ میلی گرم در روز مصرف می شود که این مقدار را بر حسب نیاز و تحمل
بیمار می توان به ۵-۱۵ میلی گرم در روز افزایش داد.

کودکان: مقادار مصرف این دارو در کودکان تعیین نشده است.

عواراض جانبی:

هر دارو به موارد انترات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض
ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد لیکن در صورت بروز
هر یک از آنها با پژشک خود مشورت کنید.

عواراض که نیاز به توجه پژشکی دارند:

نادر: احساس بویستی، افزایش فشار داخل چشم (در چشم)، اغتشاش شعور (در
سالخوردگان) یا در صورت مصرف مقادیر زیاد نایاتر است.

عواراض که در صورت تداوم با مراجعت نیاز به توجه پژشکی دارند:
شایع: تاریزید، بیوست، کاهش تعریق، دفعه ششکل سیار در دندها ادرار به ویژه در
پیرمردان، خواب الودگی، خشکی دهان، بیضی و گلو، تهوع یا استفراغ، افزایش
حساستی چشم به نور و هیجان زدگی غیر عادی.

مسهومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسحومین
 منتقل کنید.

شرايط نگهداری:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایند.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان

این دارو برای بیماری‌های فلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد
مشابه و با توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پژشک خود مشورت کنید.

- در صورت سایه‌های حساسیت به تری هگزیفینیدیل و یا هر نوع دارو، غذا، ماده
محافظه و ماده رنگی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضعف سیستم اعصاب مرکزی
(مانند داروهای آرامیکس‌ر و السکل)، آماتادین و داروهای انتی کولینزیک،
مهار کننده‌های موتوآئین اکسیداز MAO (مانند فورازولیدون، بروکاربازین و
سلیلین)، داروهای ضد اسهال جانب، لوودوبیا، کربن دیوکسیل و کلروبازین.

- در صورت ابتلاء یا سایه‌های هر نوع بیماری از جمله اریتمی قلبی، گلوکوم
با زاویه سسته، بیماری‌های قلبی-عروقی، فشار خون، هایپر تروفی پرورستان،
دیسکینیزی تأثیری، انسداد کامل یا ناقص روده‌ها، اختیاف ادرار و تاراسایی‌های
کبدی و کلیوی.

صرف در بارداری و شیردهی:

دوران بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود مگر با
صلاحیت پژشک.

دوران شیردهی: مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.
هشدارها:

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.

- برای کاهش عوارض گواراپس دارو را همراه با غذا مصرف کنید.

- در صورت فراموش کردن سک نوبت مصرف دارو به محض یادآوری آن را مصرف
نکنید ولی اگر ۲ ساعت تا زمان مصرف نوبت بعدی مانده است از آن نوبت
صرف نظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را زیر توپ نکنید.

- همچنان سیستم عصبی خودداری کنید.
مضغ عضیت عصبی مركزی خودداری کنید.

- یک یا دو ساعت پس از مصرف این دارو از مصرف داروهای ضد اسهال
خودداری کنید.

- هنگام اینجام فعالیت بدنبال هوازی گرم احتیاط کنید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی یا تاریزید گردد لذا ضمن
درمان از راندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

- احتیال برخود شکنی دهان و وجود دارد برای رفع این عارضه از اداما بدون
شکر یا بین استفاده نمانید.

- در صورت تداوم خشکی دهان بیش از ۲ هفته با پژشک خود مشورت نمایند.

- در طول مصرف این دارو، حساسیت چشمهای به نور ممکن است افزایش یابد.