

وسکوهرب®

عصاره میوه گیاه قره قاط

شکل دارویی : قرص روکشدار

تولید دارویی :

هر قرص طاوی عصاره خشک میوه گاه قره قاط (Vaccinium myrtillus Bilberry) محظوظ ۵۸ میلی گرم آنتوسبایوزید می باشد.

مواد مؤثره :

عصاره خشک میوه قره قاط محظوظ ترکیبات مؤثره شامل تانن ها، اسیدهای فولیک، فلاونوئدها و آنتوسبایوزیدها از جمله گلیکوریدهای سپانیدین، دلفینیدین، مالوئیدین، پتوئیدین و پتوئینیدین می باشد.

فارماکولوژی :

اشراث فارماکولوژیک آنتوسبایوزیدها عمدتاً بر روی میکروسیرکولاسانیون مشهود است و عبارتند از :

(الف) اثر محفوظ کننده عرقو :

این اثر ناشی از توانایی آنتوسبایوزیدها برای کاهش نفوذپری و افزایش مقاومت مویرگی است که از طریق مکانیسم های مختلف اعمال می شود :

- تحریک بیوسنتر موکوبیک ساکاریدها (جزء باقیه ای از اطراف عروق) که نقش مهمی را در ظرف کپارچکی مویرگها ایفا می کنند.

- مهار آنزیمهای بروتولیپتیک مانند الاستاز که در تخریب کلاژن و سایر اجزاء ماتریکس خارج عرق خوش بینند.

- فعالیت آنتی اکسیدانی که باعث محفوظت مویرگها در بررسی آسیب رادیکال های آزاد می شود از اسیب ایسکمیک در شکه مویرگها.

این اشراث از ایجاد آگزودهای ساخت (ساخت خاص تغییر نفوذپری مویرگها) و میکروههosoژی (ساخت خاص مقاومت مویرگها) جلوگیری نموده و بهبود آنها را تسريع می کند. این اشراث مخصوصاً در بافتی ای از مانند شبکه که شبکه مویرگی آن در

طی شرایط پاتولوژیک مانند دیابت و سایر رفتن فشار خون شریانی در معرض خطر زیادی قرار دارد بسیار حائز اهمیت است.

(ب) تغییر در قطر شریانی :

آنتوسبایوزیدهای قره قاط با افزایش قدرت شریانی جریان خون مویرگها را بهبود می بخشد، توزیع جدد جریان خون را تحریک کرده و شبکل مابین بین بافتی را کاهش می دهد. این بافتی ها حاکی از این است که عصاره میوه قره قاط

باعث افزایش عرضه مواد مذکور به بافت هایی که متابولیسم بسیار فعال دارند می شود، مانند شبکه که به صورت مداوم در گیر بازسازی دوپسین است. همچنین این عصاره ادم موضعی رانیز کاوش می دهد.

(ج) افزایش سرعت بازسازی دوپسین :

تحقیقات نشان داده است که عصاره میوه قره قاط با افزایش سرعت بازسازی دوپسین موجود در شبکه عملکرد بینایی را بهبود می بخشد.

مقدار و نحوه مصرف :

- مقدار و نحوه مصرف دارو تو سط پزشک تعیین می گردد ولی بطور معمول روزی ۲-۳ بار، هر بار یک قرص با آب کافی می باشد.
- برای کاهش تحریکات گوارشی دارو را همراه با غذا مصرف نمایید.
- مصرف این دارو در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه قرار نگرفته است.

موارد مصرف :

- درمان اختلالات ناشی از شکنندگی مویرگها
- درمان رئیتوپاتی (یماری غیر التهابی شبکیه) ناشی از دیابت یا پرفساری خون
- درمان خستگی چشم و بیهوشی معلکرد بینایی خصوصاً اختلالات دید در شب (شب کوری)
- درمان عالائم ناشی از نارسایی مزمن وریزی مانند اورپس، احسان سستگینی و درد در پاهای، کرامب و ادم پاها.

نکات قابل توصیه :

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت ساقیه حساسیت به این دارو یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
- در صورت مصرف هر نوع دارو
- در صورت ساقیه ابتلاء به هر نوع بیماری

عارضات جانبی :

- بذرگ نمکن است باعث ناراحتی های گوارشی از جمله تهوع خفف شود.
- در موارد نادر ممکن است باعث اکتشافیهای آلرژیک از جمله راش بوسٹی و خارش گردد که در صورت بروز مصرف دارو را قطعی کرده و به پزشک خود اطلاع دهد.

تداخلات داروی :

- صرف هم زمان این دارو با وارفارین توصیه نمی شود.

بارداری و شیردهی :

- صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحیت پزشک متخصص.

شرایط نگهداری :

- دارو از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.