

زولپیدم

قرص روکشدار ۵ و ۱۰ میلی گرمی

- در صورت مصرف بیش از یک تا دو هفته، قبل از مشورت با پزشک دارو را قطع نکنید چرا که ممکن است قطع تدریجی آن توسط پزشک لازم باشد.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو و طول مدت درمان را پزشک تعیین می کند ولی

مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان : ۱۰ میلی گرم هنگام خواب

کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال: اینقدر و اثر اینچشمی آن به اثایت نرسیده است.

سالمندان : ۵ میلی گرم هنگام خواب که دوز براساس نیاز بیمار است. میلی گرم در روز افزایش می یابد. افراد مبتلا به تاراحتی کبدی و کلیوی ممکن است به مقدار مصرف کمتری از این دارو نیاز داشته باشند.

عارض جانبی :

هر دارو به سوازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگر چه همه این عوارض در یک فرد اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز عارض زیر با پزشک مشورت نمائید:

بی نظمی حرکتی، گیجی در طول روز، افسرده‌گی، حساسیت بوستی، تحریک پذیری، توهّم، بی خوابی، کاپسوس، خشکی دهان، گرفتگی، درد معده و شکم، اسهال، تهوع و استقرار، سر درد، احساس بیمار بودن، لرزش، ضعف و خستگی.

مسومومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو، بیمار را سریعاً به بیمارستان مسومومین منتقل نمائید.

شایط نگهداری :

- دارو را از دسترس اطفال نگهداری کنید.

- دارو را دور از نور، حرارت و رطوبت، و در دماهی کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای قید شده روی جعبه خودداری نمائید.



شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان

این دارو برای بیماری فلیی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و با توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سایه حساسیت به زولپیدم و هر نوع دارو، غذا، ماده محافظه و ماده رنگی.

- در صورت مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی و ضد افسرده‌گی های سه حلقه‌ای مثل آمی تریپتیلین، کلومپرامین، دوکسپین و نورتربیتیلین.

- در صورت ابتلاء به هر نوع بیماری از جمله ناراحتیهای مزمن ریوی، اعتیاد، آسم، افسرده‌گی، قطع تنفس هنگام خواب، تاراسای کلیوی و کبدی و مسمومیت با الکل.

مصرف درباری و شیردهی :

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود، مگر با تجویز و صلاحید پزشک متخصص.

هشدارها :

- دارو را فاقد با توصیه پزشک مصرف کنید و از مصرف بیش از حد آن خودداری نمایید.

- دارو را با معده خالی مصرف کنید.

- دارو را درست قبل از خواب مصرف نمایید.

- در صورتی که نمی توانید یک خواب کامل ۷-۸ ساعته را برای خود تنظیم کنید، از مصرف این دارو اجتناب کنید زیرا احتمال اولدگی در روز بعد وجود دارد.

- به علت ایجاد وابستگی دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنید.

- بدون مشورت با پزشک مقدار داروی خود را افزایش ندهید.

- در صورت علائمی چون پرخاشگری، رفتارهای غیر عادی، توهّم، مشکلات حافظه، اشکال در تمکز، بروز افسرده‌گی و یا شدید شدن آن، گیجی، تغییر در خلقيات و رفتارها به پزشک مرآجه نمایید.

- از آنجایی که این دارو ایجاد حالات گیجی و منگی، کاهش هوشیاری و دو بینی می نماید، هنگام رانندگی و کار با ماشین‌آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد احتیاط کنید.