

لوپرامید (Loperamide)

دسته دارویی: ضد اسهال
برند داروسازی امین: Amilopra[®]

شکل دارویی: قرص ۲ میلی گرمی / شربت یک میلی گرم در ۵ میلی لیتر

نحوه عملکرد دارو

لوپرامید یک داروی سنتیک برای درمان اسهال است. این دارو از طریق تحریک گیرنده های ((مو م)) در پایانه های اعصاب کولینرژیک درستگاه گوارش، باعث کم شدن آزادی استیل کولین و درنتیجه باعث کاهش موتیلیته دستگاه گوارش و افزایش transit time روده ای می شود. این دارو بعنوان داروی ضد اسهال ۴۰ تا ۵۰ مرتبه قوی تر از مورفین بوده و خیلی کم به سیستم عصبی مرکزی نفوذ می کند (زیرا توسط ترانسپورتر P – گلیکوبروتنین که در سد خونی مغزی فراوان است بعنوان Efflux Pump عمل کرده و دارو را از سیستم عصبی مرکزی خارج و مانع تجمع آن در آنجا می شود). قسمتی از اثر ضد اسهال لوپرامید نیز مربوط به کم کردن ترشحات در دستگاه گوارش و تحت تأثیر قراردادن حرکات آب و الکترولیت از روده است.

مشخصات فارماکوکینتیکی دارو

لوپرامید پس از مصرف از راه خوراکی خوب جذب نمی شود. ۴ ساعت پس از مصرف ، غلظت پیک در خون ایجاد می شود. نیمه عمر حذف دارو ۷ تا ۱۴ ساعت است. بطوریکه اشاره شد لوپرامید به سیستم عصبی خوب نفوذ نمی کند . دارو در کبد متابولیزه می گردد. لوپرامید توسط سیتوکرم P450 (بویژه ایزوفرم های CYP₂C₈ و CYP₃A₄) متابولیزه شده و N- دمتیله می شود. راه اصلی دفع دارو مدفعه و تا حدودی نیز ادرار است. دارو به مقدار کم از سد جفتی عبور کرده و نیز به مقدار کم به شیر مادر وارد می شود.

موارد مصرف دارو

- برای کنترل اسهال حاد non-specific و بعنوان داروی کمکی در همه انواع اسهال مزمن از جمله اسهال مربوط به بیماری التهابی روده
- درمان اسهال مسافرتی به تنها بی یا همراه با داروهای ضد باکتری مثل کوتريموكسازول
- برای کم کردن ileostomy discharge

مقدار و روش مصرف

دوز معمول لوپرامید ۴ میلی گرم در آغاز درمان است که ۲ میلی گرم پس از هر بار دفع مدفعه ادامه می یابد و اما نباید روزانه بیش از ۱۶ میلی گرم مصرف شود. حداکثر دوز توصیه شده برای بچه های ۲ تا ۵ ساله ، ۳ میلی گرم در روز ، برای بچه های ۶ تا ۸ ساله ، ۴ میلی گرم در روز و برای بچه های ۸ تا ۱۲ ساله ، ۶ میلی گرم در روز است. لوپرامید نباید در بچه های زیر ۲ سال مصرف شود.

موارد منع مصرف دارو

- در بیمارانی که به لوپرامید یا سایر مواد موجود در فرمولاسیون دارو آلرژی دارند.
- در بیمارانی که شکم درد دارند(بدون اسهال).
- در بچه های زیر ۲ سال
- در بیماران مبتلا به یبوست
- در بیماران مبتلا به اسهال خونی و تب بالا
- در بیماران مبتلا به اسهال ناشی از اورگانیسم هایی که به مخاط روده نفوذ می کنند (مثل اشریشیا کلی ، سالمونلا، شیگلا ، کلستریدیوم دیفیسایل).

عوارض جانبی

در برخی از بیماران مصرف لوپرامید ممکن است بعضی از عوارض زیر را ایجاد کند: احساس خستگی، سرگیجه، خواب آلودگی، ایجاد مگاکولون سمی(در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو)، درد شکم، یبوست، خشکی دهان، تهوع، بثورات پوستی، نفخ، سوء هاضمه.

تداخل اثر

- مصرف توأم مهارکننده های P- گلیکوپروتئین (مثل کینیدین، ریتوناویر، کتوکونازول و وراپامیل)، اثر لوپرامید در سیستم عصبی مرکزی را افزایش می دهد.
- مصرف توأم لوپرامید با ساکوئیناویر(داروی ضد ایدز) غلظت خونی ساکوئیناویر را ۵۰٪ کاهش می دهد.

صرف دارو در دوران حاملگی و شیردهی

مطالعه کافی و خوب کنترل شده ای برای اثر لوپرامید در خانم های حامله وجود ندارد. لوپرامید در طول حاملگی باید موقعی مصرف شود که سودمندی آن برای مادر در برابر خطر آن برای جنین قابل توجیه باشد. مقدار کمی از دارو وارد شیر مادر می گردد و لذا در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

نکات آموزشی درباره این دارو

- ۱- تولرنس به اثر ضد اسهالی لوپرامید ایجاد نمی شود.
- ۲- اثرلوپرامید در درمان اسهال علامتی است . اگر علت اسهال مشخص شود در صورت لزوم باید درمان اختصاصی شروع شود.
- ۳- در بیماران مبتلا به اسهال ، غالباً تخلیه آب و الکترولیت بدن ایجاد می شود که باید جایگزین گردد. مصرف لوپرامید نیاز به مایع و الکترولیت را منتفی نمی کند.
- ۴- اگر در عرض ۴۸ ساعت اسهال بند نیاید یا در مدفوع خون دیده شود و یا تب ایجاد شده و دیستانسیون شکم ایجاد شود ، باید درمان قطع و شرایط به پزشک معالج گزارش گردد.
- ۵- در موقع درمان با لوپرامید ، باید با احتیاط رانندگی یا اپراتوری کرد (دارو ایجاد سرگیجه و خواب آلودگی و خستگی می کند).
- ۶- در حین درمان باید مایعات کافی نوشیده شود.
- ۷- در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی و کولیت اولسراتیو حاد ، باید با احتیاط مصرف گردد.
- ۸- برای مداوای اوردوز (صرف بیش از حد) یا تضعیف CNS ، از نالوکسون (آنتاگونیست اوپیوئید) استفاده می شود.
- ۹- با توجه به اینکه کتونازول ، CYP₃A₄ را مهار می کند، در صورت مصرف همزمان آن با لوپرامید، N-دمتیلاسیون لوپرامید شدیداً متوقف می شود.

صرف دوز بیش از حد و روش درمان آن

با اوردوز، احتباس ادراری ، ایلئوس فلچی و تضعیف CNS (مخصوصاً در بچه ها) ایجاد می شود. استفاده از کربن فعال شده همراه آب، از جذب بیشتر لوپرامید به جریان عمومی خون جلوگیری می کند. نالوکسون می تواند بعنوان آنتی دوت (پاذهر) تزریق شود.

شرایط نگهداری دارو

دارو دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

نوع بسته‌بندی دارو

جعبه حاوی بلیسترهاي ۱۰ عددی
شربت ۶۰ میلی لیتری