

دلوکستین ۳۰ و ۶۰ میلی گرم

پکسول (گرانولهای انتریک کوتد)

- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید به محض به پاداوردن آنرا مصرف کنید. اما اگر زمان نوبت بعدی رسیده است، از مصرف آن نوبت صرف نظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب‌آنودگی گردد لذا هنگام رانندگی یا کار با لوازمی که نیاز به هوشیاری کامل دارند اختیاط نمایید.

- در صورت داشتن هرگونه عمل جراحی از جمله جراحی دندان، پزشک خود را از مصرف این دارو آنکه سازید.

- مصرف این دارو در کودکان زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

- دلوکستین ممکن است در اوائل درمان هنگام از جا برخواستن سریع از حالت خوابیده ایجاد گنجی، بینکی و ضعف نماید. برای احتساب از این حالات، به اقسام از جا برخیزید و قلب از ایستادن چند دقیقه بشنیدن.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می‌کند.

عوارض جانبی :

هر دارو به موارد اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. در صورت شدید بودن علائم زیر با پزشک خود مشورت کنید: تهوع، استخراج، اسهال، بیوست، سوزش سر، درد معده، کاهش اشتها، خشکی دهان، تکر ادرار، ادرار دردناک، تعریق شبانه، ضعف، خستگی.

در صورت بروز علائم زیر سریعاً به پزشک خود اطلاع دهد:

درد در قسمت بالای رانست معده، خوشیزی یا کسیدگی غیر عادی، ورم شکم، خارش، زرد شدن پوست و چشم، تیره شدن دنگ ادرار، کاهش اشتها، خستگی و ضعف شدید، عالائم شبیه افول‌ازرا، اسب، تعریق، ضربان قلب نامنظم، تاری دید، کهیرون، اشکال در تنفس و بلع، تورم صورت، گل، زبان، چشمها، دست و پاها.

مسومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسومین منتقل نمایید.

شرايط نگهداري :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري کنید.

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتيگراد نگهداري نمایید.



شرکت دارو-سایزی امین
ایران - اصفهان

این دارو برای بیماری فلیل شما تجویز نشده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و با توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی‌ها و عومنو :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سایقه حساسیت به این دارو یا نزد شوهر اینها و سایر داروهای ضد تشنج، هر گونه غذا، ماده محافظه و ماده رنگی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله تیوریدازین، کلامبیرامین، داروهای مهار کننده MAO نظری ترائیل سیپرومین و سالزین و یا قطعی این داروها در روز گذشته، در صورت مصرف وارپرین، خسد افسریدگاهیان چون آمی ترتیپتین، کلامبیرامین، ایمسی پرامین، خسد الیاپاهیان غیر استروتیبدی چون ایوبروفن و تایروکسین، سامیتیدین، امیودارون، ریزاتریپتان، سمواتریپتان و بعضی مهار کننده های باز جذب سروتونین چون فلوكستین و فراورده های حاوی الکل.

- در صورت ابتلا به سایقه ایالتا به هر نوع بیماری از جمله گلوکوم، حمله قلبی، فشار خون بالا، شنج بیماری کرونی قلب، بیماریهای کلیوی، کبدی و قلبی و دیابت.

صرف در بارداری و شیردهی :

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها :

- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید.

- دارو را هر روز در زمان مشخص مصرف نمایید.

- کیسول را به طور کامل ببلندی و از شکستن، خودن و خرد کردن آن بپرهیزید. کیسولها را باز نگیند و محتویات آنها را با مایعات مخلوط نکرده و با روی غذا نباشید.

- پزشک شما ممکن است دارو را با دوز کم شروع کرده و به تدریج و بعد از یک هفته آن را افزایش دهد.

- دلوکستین عالائم بیماری اشاره کنند می کند و پیشیت شما درمان نمی کند.

- ممکن است ۱ تا ۲ مغتله به باشتر طول بگشتد تا دلوکستین اثربخشی خود را ثابت نماید. حتی در صورت احساس پنهانی به مصرف خود ادامه دهد. پزشک شما

ممکن است تدریجیاً دوز داروی شما را کاهش دهد.

- در صورت قطعی ناگهانی دلوکستین شما ممکن است دچار تهیوוע، استخراج، اسهال، اضطراب، گنجی، خستگی، سردرد، سوزش، کرکی یا گزگز شدن دست و پاها، تحریک پذیری، اشکال در به خواب رفتن، تعریق و کاوس های شبانه شود. در صورتی که با کاهش دوز این دارو در جایگاه عالیم شدید به

پزشک خود اخراج دهد.

- بدون دستور پزشک داروی خود را قطع ننمایید و یا دوز آن را کاهش ندهید.