

گارلت (Garlet)

دسته دارویی: داروی گیاهی

شکل دارویی: قرص روکشدار (SC) با بوی مهار شده

ترکیبات دارویی: قرص روکش دار حاوی ۴۰۰ میلی گرم پودر خشک سیر استاندارد شده بر اساس آلیسین (۱۲۰۰-۱۸۰۰ میکرو گرم) و معادل ۲ گرم سیر تازه

مواد مؤثره و نحوه عملکرد

سیر حاوی یک روغن فرار است که ترکیبات آن مسئول اکثر خواص فارماکولوژیکی سیر می باشند. بیشتر از ۳۰ ترکیب گوگرددار در سیر وجود دارند که از مهمترین آنها می توان به آلین، آلیسین، اجوان (ajoene)، S-آلیل سیستئین اشاره نمود.

علاوه بر ترکیبات گوگرددار، سیر حاوی اسیدهای آمینه (مثل آرژینین) و مواد معدنی (مثل سلنیوم) و آنزیم ها (مثل آلیناز) می باشد. ترکیبات گوگرددار موجود در سیر، مسئول بوی تند و نیز اثراست دارویی سیر هستند. بوی سیر از اثر آنزیم آلیناز روی آلین و تولید آلیسین ایجاد می شود. این آنزیم در اثر حرارت، غیر فعال می شود و به این علت سیر پخته شده بوی چندانی نداشته و اثراست دارویی کمتری دارد. آنزیم آلیناز در اثر له شدن یا خورده شدن در سیر فعال شده و آلیسین آزاد می کند. آلیسین اثراست ضد ویروسی، ضد باکتری، ضد قارچ، اثر پائین آورندگی چربی های خون، اثر مثبت روی سیستم ایمنی بدن (مثل عکر کردن NK Cells) و اثر پائین آورندگی فشار خون دارد. Ajoene از ترکیبات گوگرددار دیگر موجود در سیر است که اثراست ضد لخته شدن خون (آنتمی ترومیوز) و ضد سرطانی دارد. بیشترین اثر آنتی اکسیدانی را در سیر، S-آلیل سیستئین دارد.

موارد مصرف

سیر می تواند در کنترل فشار خون همراه داروهای اصلی ضد فشار خون مصرف شود. با توجه به اثراست ضد میکروبی، عالیم سرماخوردگی و آنفولانزا را کاهش می دهد. اثر پائین آورندگی چربی خون توسط سیر، کمک به جلوگیری از آتروواسکلروزیس و اثر آنتی اکسیدانی سیر کمک به جلوگیری از آسیب به شریان ها می کند. عقیده بر این است که سیر می تواند در بیماران دیابتی (که تحت درمان با داروهای ضد دیابت هستند) به درمان این بیماران کمک کند. سیر همچنین می تواند عنوان آنتی سپتیک در روده سودمند باشد.

همچنین گارلیک می تواند به عنوان عامل آهسته کننده aging، سودمند باشد.

مقدار مصرف

دو یا سه بار در روز ، هر بار یک قرص

موارد احتیاط و منع مصرف

با مصرف طولانی مدت سیر، کم خونی گزارش شده است.

عوارض جانبی

در تعدادی از بیماران ممکن است عوارض گوارشی و واکنش های آлерژیک ایجاد شود.

تداخلات دارویی

مصرف توام سیر با داروهای ضدانعقاد خوراکی (وارفارین) ، اثر آنها را تشدید می کند، زیرا سیر نیز اثر ضد انعقادی دارد.

بارداری و شیردهی

مصرف آن در دوران حاملگی و شیردهی توصیه نمی شود.

شرایط نگهداری دارو

دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

نوع بسته بندی دارو

جعبه حاوی بلیسترهاي ۱۰ عددی