

جمی فلوکسایسین (Gemifloxacin)

دسته دارویی : ضد باکتری، فلوروکینولون نسل چهارم

برند داروسازی امین :[®] Bronflect

شکل دارویی : قرص های ۳۲۰ میلی گرمی با روکش فیلم (FC)

نحوه عملکرد دارو

جمی فلوکسایسین یک ضد باکتری وسیع الطیف از گروه فلوروکینولون هاست و بنابراین نحوه عملکرد آن مانند سایر فلوروکینولون ها می باشد. (مراجعه شود به سیپروفلوکسایسین).

مکانیسم اثر این داروها متفاوت از مکانیسم اثر آنتی بیوتیک هایی مثل بتالاکتام ها، آمینوگلیکوزیدها یا تتراسایکلین ها است. بنابراین باکتری های مقاوم به این آنتی بیوتیک ها می توانند به جمی فلوکسایسین و سایر فلوروکینولون ها حساس باشند.

مشخصات فارماکوکنیکی

جمی فلوکسایسین به سرعت از دستگاه گوارش جذب می شود. ۰/۵ تا ۲ ساعت پس از مصرف، حداقل غلظت خونی دارو ایجاد می شود. نیمه عمر آن ۴ تا ۱۲ ساعت است. این دارو می تواند همراه غذا یا بدون غذا خورده شود. در خون ۶۰ تا ۷۰٪ به پروتئین ها متصل می شود.

جمی فلوکسایسین در بدن به طور وسیع منتشر می شود. غلظت آن در مایع شستشوی Bronchoalveolar بیشتر از غلظت آن درخون است. جمی فلوکسایسین به خوبی به بافت ریه و مایعات آن نفوذ می کند. در کبد قسمت کوچکی از دارو متابولیزه می شود . چهار ساعت پس از مصرف دارو تقریباً ۶۵٪ آن بصورت دست نخورده درخون موجود است. سیتوکروم P450 نقش چندانی در متابولیسم این دارو ندارد و فعالیت متابولیکی این آنزیم ها توسط جمی فلوکسایسین مهار نمی شود.

تقریباً ۷۰٪ دارو از طریق مدفع و ۳۰٪ آن از طریق ادرار دفع می شود. جمی فلوکسایسین از جفت عبور کرده و وارد شیر مادر شیرده می شود.

موارد مصرف

۱- برونشیت مزمن که بصورت حاد تشید شده باشد و ارگانیسم مسبب آن استرپتوكوکوس پنومونیا، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا یا موراکسلاکاتارالیس باشد.

۲- درمان ذات الریه کسب شده از جامعه (Community-Acquired Pneumonia) ناشی از استرپتوكوکوس پنومونیا (از جمله سویه های مقاوم به چند دارو یعنی MDRSP)، هموفیلوس آنفلوآنزا، موراکسلا کاتارالیس، میکوپلاسمای پنومونیا، کلامیدیا پنومونیا یا کلبسیلا پنومونیا.

MDRSP به استرپتوکوس پنومونیای مقاوم به پنی سیلین و سویه های مقاوم به دو یا چند دارو مثل سفوروکسیم، ماکرولیدها، تتراسایکلین ها و کوتیریموکسازول اطلاق می شود.

مقدار و روش مصرف دارو

- ۱- دوز دارو در برونشیت مزمن حاد شده برای بزرگسالان ۳۲۰ میلی گرم در روز از راه خوراکی به مدت ۵ روز است.
- ۲- در درمان ذات الریه کسب شده از جامعه، ۳۲۰ میلی گرم در روز از راه خوراکی به مدت ۵ روز برای استرپتوکوس نومونیا، هموفیلوس آنفلوآنزا، میکوباکتریوم پنومونیا و کلامیدیا پنومونیا و ۷ روز برای سویه های استرپتوکوس نومونیا، کلبسیلا نومونیا یا موراکسلا کاتارلیس مقاوم به چند دارو (MDR).
- ۳- دوز دارو در بیمارانی که کلیرنس کراتینین آنها کمتر از ۴۰ میلی لیتر در دقیقه باشد، ۱۶۰ میلی گرم در روز است.

موارد منع مصرف دارو

- ۱- بیماران با سابقه حساسیت به جمی فلوکسازین و سایر فلوروکینولون ها
- ۲- بیماران با سابقه Tendinitis و پارگی تاندون
- ۳- بیماران با سابقه وجود فاصله QT طولانی یا فاصله QT طولانی ناشی از کمبود پتاسیم و منیزیم و یا بیماران تحت درمان با داروهایی مثل ضد آریتمی های کلاس 1A (مثل کینیدین و پروکائین آمید) یا ضد آریتمی های کلاس III مثل آمیودارون

عوارض جانبی

جمی فلوکسازین در بعضی از بیماران ممکن است بعضی از عوارض زیر را ایجاد نماید؛ سردرد، سرگیجه، بی اشتهاایی، لرزش، بیخوابی، افزایش فاصله QT، اسهال، کولیت اولسراتیو، درد شکم، استفراغ و بعضی عوارض پوستی.

تداخل اثر

- ۱- با مصرف همزمان جمی فلوکسازین و کاتیون های ۲ ظرفیتی و ۳ ظرفیتی، جذب جمی فلوکسازین کاهش می یابد.
- ۲- مصرف همزمان جمی فلوکسازین با کینیدین، پروکائین آمید، آمیودارون، اریتروماکسین، باعث افزایش فاصله QT می شود.
- ۳- مصرف توان جمی فلوکسازین و پروبنسید، باعث کاهش کلیرنس جمی فلوکسازین و افزایش غلظت آن در خون می گردد.

صرف دارو در دوران حاملگی و شیردهی

جمی فلوکسازین در FDA Pregnancy Category C قرار دارد. سالم بودن این دارو در حاملگی ثابت نشده است و لذا نباید در خانم های حامله مصرف شود مگر اینکه سودمندی آن بیشتر از خطر آن برای جنین باشد.

دارو از طریق شیر دفع می گردد و لذا نباید در دوران شیر دهی مصرف شود مگر اینکه سودمندی آن برای مادر بیشتر از خطر آن برای بچه شیر خوار باشد.

نکات آموزشی درباره جمی فلوکسازین

- ۱- در نارسایی کبدی نیازی به تعديل دوز دارو نبوده ولی در نارسایی شدید کلیوی دوز دارو باید تعديل شود.
- ۲- در صورتیکه بیمار تحت درمان با این دارو نیاز به مصرف آنتاسید (یا داروهای حاوی آهن و زینک) داشته باشد باید این داروها ۳ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از جمی فلوکسازین مصرف شوند.
- ۳- سوکرافیت باید ۲ ساعت قبل از مصرف جمی فلوکسازین مصرف شود.
- ۴- با مصرف این دارو همانند سایر فلوروکینولون ها، خطر التهاب تاندون و پارگی تاندون بویژه تاندون آشیل در هر سنی وجود دارد.
- ۵- جمی فلوکسازین ممکن است اثر ضعف عضلانی در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس (ضعف شدید عضلانی) را بدتر کند.
- ۶- دارو باید یک بار در روز و در ساعت معین مصرف شود.
- ۷- دارو باید در دوره کامل تجویز شده مصرف گردد (حتی اگر بیمار احساس بهبودی کند).
- ۸- قرص باید بدون نصف کردن یا جویدن بلعیده شود.
- ۹- همراه این دارو مایعات زیاد خورده شود.
- ۱۰- در صورت احساس درد حاد در عضله یا تاندون ، مصرف دارو باید قطع شود.

صرف دوز بیش از حد دارو و درمان آن

در Overdose حاد خوراکی، معده باید خالی شده و بیمار درمان حمایتی شود. آنتی دوت ویژه ای برای دارو وجود ندارد. همودیالیز ۲۰ تا ۳۰٪ داروی موجود در خون را خارج می کند.

شرایط نگهداری دارو

دارو دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

نوع بسته بندی دارو

بسته بندی کتابی ۵ عددی