

فیتوون (Phytoven)

دسته دارویی : داروی گیاهی

شكل دارویی : قرص روکش دار در روده بازشونده(EC)

ترکیبات دارویی: هر قرص حاوی ۳۰۰ میلی گرم عصاره خشک دانه‌های گیاه شاه بلوط هندی(Horse chestnut) (Horse chestnut) محتوی ۵۰ میلی گرم گلیکوزیدهای تریترپنوتئیدی براساس آئسین می باشد.

مواد موثره و نحوه عملکرد

عصاره خشک دانه های گیاه شاه بلوط هندی با نام علمی (Aesculus hippocastanum) محتوی ترکیبات موثره شامل گلیکوزیدهای تریترپنوتئیدی از جمله آئسین، فلاونوئیدها، تانن ها، کینون ها و استرونول ها می باشد.

اثر درمان نارسایی مزمن وریدی این دارو مربوط به گلیکوزیدهای تریترپنوتئیدی خصوصاً آئسین می باشد. آئسین سرعت تراوش مایعات از دیواره ملتهد و آسیب دیده عروق را از طریق مهار آنزیم های لیزوزومی و در نتیجه ممانعت از تخریب گلیکوکالیکس دیواره های مویرگی کاهش می دهد. همچنین با کاهش نفوذ پذیری عروق از نشت پروتئین های با وزن مولکولی پایین، الکتروولیت ها و آب به درون فضاهای میان بافتی جلوگیری می کند و با افزایش تونیسیته وریدها ، بازگشت خون به قلب را بهبود می بخشد.

در یک مطالعه دو سو کور نشان داده شده است که تجویز عصاره استاندارد شده شاه بلوط هندی ، روزانه ۶۰۰ میلی گرم حاوی ۱۰۰ میلی گرم آئسین، پس از سه هفته به طور قابل توجهی علائم بیماران مبتلا به واریس را کاهش داد. در مطالعه دو سو کور کنترلی روی ۲۰ بیمار تحت درمان با عصاره شاه بلوط هندی حاوی ۱۰۰ میلی گرم آئسین در روز نشان داده شده است که این دارو پس از ۴ هفته بهبودی قابل ملاحظه ای در کاهش تورم و احساس سنگینی پا و علائم دیگر در مقایسه با پلاسبو (دارونما) اعمال می نماید.

موارد مصرف

- پیشگیری و درمان بیماریهای عروقی محیطی مثل وریدهای واریسی پا (varicose veins) و هموروئید (که همراه با ورم ورید بافت های اطراف آنوس یا اتساع واریسی شبکه بواسیری است).
- درمان علائم CVI مانند احساس سنگینی در پاها ، گرفتگی عضلات ساق پا ، خارش و ادم پا

مقدار مصرف

۲ بار در روز صبح و عصر هر بار یک قرص بعد از غذا به همراه مقدار کافی آب میل شود.

موارد احتیاط و منع مصرف

- ۱- از مصرف این دارو در خانم های حامله و مادران شیرده اجتناب شود.
- ۲- این فراورده قند خون را پائین می آورد ، مصرف آن با سایر فراورده های گیاهی کاهنده قند خون باعث هیپوگلیسمی می شود.
- ۳- اثرات داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکت را تشدید می کند.
- ۴- در بیمارانی که بیماریهای گوارشی دارند مصرف نشود.

عوارض جانبی

در موارد نادر ممکن است باعث تحریک دستگاه گوارش گردد.

تداخلات داروبی

این فراورده با داروهای ضد انعقاد ، ضد پلاکت و ضد دیابت با احتیاط مصرف شود. با توجه به انتریک کوتده بودن فرمولاسیون (در روده بازشونده) نباید همزمان با داروها و خوراکی های قلیایی کننده مصرف شود.

بارداری و شیردهی

از آن جا که مطالعات کافی انجام نگرفته است، مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

شرایط نگهداری دارو

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

نوع بسته‌بندی دارو

جعبه حاوی بلیسترهاي ۱۰ عددی