

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو یک قرص در روز بعد از غذا می باشد.

عوارض جانبی :

در موارد نادر ممکن است باعث واکنشهای حساسیتی (سرفه، اشکال در بلع، کهیر، خارش پوست، تورم صورت یا لب ها، خس خس سینه یا اشکال در تنفس) گردد.

مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده توسط پزشک، بیمار را به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.
- به تاریخ انقضای قید شده روی جعبه دارو توجه و از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایهای عمومی :

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت سابقه حساسیت به ویتامین ب ۱ (تیامین هیدروکلراید) و یا هر نوع فرآورده، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو، مکمل های غذایی و ویتامینهای دیگر

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحدید پزشک متخصص.

هشدارها :

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، بدلیل اینکه زمان زیادی برای تخلیه ویتامین لازم است مصرف نوبت فراموش شده، ضروری نمی باشد و مصرف دارو را مطابق برنامه معمول ادامه دهید.
- در صورت وجود انسفالوپاتی ورنیکه، این دارو با احتیاط تجویز شود.
- ویتامینها جانشین تغذیه مناسب نمی باشند.
- بهترین منابع غذایی ویتامین B1 عبارتند از غلات (دانه کامل و غنی شده)، انواع گوشتها، نخود فرنگی، لوبیا و انواع آجیل