

## زینک پلاس - امین®

کپسول

### توصیه های لازم :

- در صورت ساققه حساسیت به زینک و ویتامین های گروه B به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
- در صورت مصرف هر نوع دارو به پزشک و یا داروساز خود اطلاع دهید.
- فراورده را بیش از مقادیر توصیه شده مصرف ننماید.
- مکمل های زینک بهتر است یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود، در صورت تحریک گوارنٹی می توان آن را همراه غذا مصرف کرد.
- مکمل های زینک را دو ساعت قبل از مصرف فراورده های لبنی و غذایی حاوی فیبر مانند نان های سبیوس دار یا غلات کامل یا غذایی حاوی فسفر مصرف ننماید.

### مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت نمائید.

### مقدار و نحوه مصرف :

مقادیر مصرف فراورده نویسط پزشک تعیین می گردد ولی مصرف آن بصورت معمول یک کپسول در روز با مقدار کافی آب می باشد.

### عارض جانی :

مصرف مقادیر زیاد زینک ندرتاً ممکن است باعث برخورد مشکلات گوارشی به ویژه اشکال در هضم و درد آبی گاستر، تهوع و مشکلات همانولوژیک شود.

### تدخالت دارویی :

مقادیر زیاد روی ممکن است جذب مس از طریق روده را مختل نماید. مکمل های روی ممکن است جذب تراسایلکلن را از طریق ایجاد کمپلکس های غیر محلول کاهش دهند.

### مسوومیت :

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده بیمار را به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

### شرایط نگهداری :

- فراورده را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نماید.
- فراورده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

### تولید فرآورده :

هر کپسول حاوی ۱۵ میلی گرم زینک، ۱۵۰ میکرو گرم بیوتین و ۶ میلی گرم پنتوتئین اسید می باشد.

### موارد مصرف :

- تقویت و پیشگیری از ریزش مو
- شکل گرفتن و استحکام ناخن ها
- مناسب برای سلامت پوست
- کمک به ترمیم زخم ها
- تقویت سیستم ایمنی بدن
- تقویت رشد جسمی در سنین رشد