

ویتن پلاس®

قطره خوارکی مولتی ویتامین + آهن

- از مصرف مکرر مقادیر بالای فرآورده های حاوی آهن به مدت بیشتر از ۶ ماه خودداری کنید، مگر اینکه توسط پزشک توصیه شده باشد.

- از مصرف همچنان آنتی اسیدها با این فرآورده خودداری نمایید.

- این فرآورده چهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نیست.

- پس از باز کردن در ظرف و قرار دادن قطره چکان بر روی آن، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل مصرف می باشد.

عوارض جانبی :

هر فرآورده ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک مشورت نمایید.

درد معده یا شکرک، دلیچه، بیوست، اسهال، تهوع و استفراغ

فروسن سولفات باعث سیاه شدن مذفوع می شود که عارضه مهمی نمی باشد. این فرآورده همچنین باعث تیره شدن رنگ دندانها می شود. لذا به منظور کاهش این اثر، فرآورده را با آب یا آبمیوه مصرف نمایید.

مقادیر و نحوه مصرف :

مقادیر مصرف فرآورده توسط پزشک تعیین می شود ولی بطور معمول وزانه ۱ میلی لیتر می باشد.

مسومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد مقدار توصیه شده بالاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه شود.

شرایط نگهداری :

- فرآورده را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخ زدگی محافظت نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

- به تاریخ انقضای قید شده روی جعبه فرآورده توجه و از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری کنید.

این فرآورده برای شرابات فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.

- در صورت سایه حساسیت به فرآورده های آهن، مولتی ویتامین و یا هر نوع فرآورده، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظت

- در صورت ابتلاء به هموگرماتوز، هموسیدروز، کم خونی هایی نظیر آئمی همولیتیک و نالاسی، کوکلی یا سایر مشکلات گوارشی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو یا فرآورده مکمل

مصرف در بارداری و شیردهی :

صرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی در صورت توصیه پزشک محاج می باشد.

هشدارها :

- فرآورده را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف نکنید.

- فرآورده را با معده خالی، یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف نمایید، ولی در صورت بروز مشکلات گوارشی، می توانید فرآورده را همراه غذا نگرفت.

- یک ساعت قبل یا ۷ ساعت بعد از مصرف این فرآورده از مصرف فرآورده های لبني، تخم مرغ، چای، قهوه، نان سبوس دار، جبو Bates، داروهای ضد اسید و فرآورده های حاوی کلسیم خودداری شود.

- فرآورده را همراه با آب یا آبمیوه مصرف کنید.

- در صورتی که یک نوبت از مصرف فرآورده را فراموش کردید، از آن نوبت صرف نظر کرده و مقدار مصرف را طبق برنامه معمول ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار مصرف فرآورده خودداری کنید.

- در صورتی که آهن را به صورت تزریقی مصرف می کنید از مصرف فرآورده های خوارکی آهن اجتناب کنید.