



- این دارو در صورت مصرف آلومینیوم یا منیزیم هیدروکساید باید با حداقل فاصله ۲ ساعت مصرف گردد.
- ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان مشخص نشده است.

مقدار و نحوه مصرف :

بزرگسالان :

- هاپیر کلسترولمی فامیلیال و غیر فامیلیال هتروزوگوت :

شروع با ۱۰ میلی گرم یک بار در روز می باشد. محدوده دوز مصرفی ۵ تا ۴۰ میلی گرم یک بار در روز است که بر اساس تشخیص پزشک بعد از ۴-۲ هفته می توان دوز دارو را تنظیم نمود.

- هاپیر کلسترولمی فامیلیال هموزیگوت: شروع با دوز پیشنهادی ۲۰ میلی گرم یک بار در روز می باشد.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد در صورت بروز هر کدام با پزشک خود مشورت کنید.

میوپاتی، رابدومیولیزیس (تب)، درد و یا گرفتگی عضلانی، خستگی غیرعادی یا ضعف، تهوع، درد شکمی، سر درد، سر گیجه، خارش، راش، کاهش اشتها، استفراغ خونی، زرد شدن پوست یا چشمها و فارتزیت

مسمومیت :

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

راهنمایهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

- در صورت سابقه حساسیت به رزوآستاتین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت وجود و یا احتمال وجود بارداری و شیردهی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله سیکلوسپورین، جم فیبروزیل، نیاسین، آنتی اسیدها، فیبراتها، داروهای کاهنده چربی خون، وارفارین، سایمتیدین، کتوکونازول، اسپیرونولکتون و داروهای ضدبارداری خوراکی.

- در صورت سابقه ابتلا به هر نوع بیماری از جمله بیماریهای کبدی و کلیوی، افت فشار خون، جراحی های عمده، عفونت های حاد، مصرف الکل، میوپاتی، تشنج های کنترل نشده، بالا رفتن سطح ترانس آمیناز، اختلالات متابولیکی، اختلالات شدید الکترولیتی و تروما.

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است.

از نظر مصرف در دوران بارداری جزء گروه X می باشد.

هشدارها :

- دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده توسط پزشک خودداری کنید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن دارو را مصرف نمائید ولی اگر به زمان مصرف بعدی زمان زیادی باقی نمانده است مطابق برنامه معمول عمل کنید و از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی دارو نیز خودداری نمائید.

- برای کنترل مراحل درمان در تاریخ های منظم به پزشک خود مراجعه نمائید.

- در صورت ایجاد درد عضلانی، ضعف عضلانی و تب حتماً به پزشک مراجعه نمائید.

- دارو را هر روز در یک زمان مشخص مصرف نمائید.

