

## مقدار و نحوه مصرف :

- مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می نماید ولی بطور معمول یک کپسول در روز می باشد.

## عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد اتفاق نمی افتد در صورت بروز هر کدام با پزشک مشورت کنید.

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند :

تب، درد عضلانی، تهوع و استفراغ، عفونت، خارش عمومی، راش پوستی و کهیر، سرفه، تنگی نفس یا سختی در تنفس، کاهش اشتها، زرد شدن چشم ها یا پوست، خستگی و ضعف.

عوارضی که در صورت تداوم یا ایجاد مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارند :

شایع : احتقان سینه، سختی در تنفس.

با شیوع کمتر : درد معده، درد پشت، اسهال، سر گیجه، سوزش چشم، سر درد، کاهش میل جنسی، افزایش حساس شدن پوست به نور خورشید، رینیت.

## مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمائید.

## شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید .

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

## راهنمایهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- در صورت سابقه حساسیت به فنونویبرات یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظه و ماده رنگی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد انعقاد (وارفارین)، داروهای مدر، بتابلوکر ها نظیر پروپرانالول، آنتولول و متوپرولول، داروهای پایین آورنده چربی نظیر آتورواستاتین، لوواستاتین و سیمواستاتین، مهار کننده های سیستم ایمنی نظیر سیکلوسپورین و تاکرولیموس و داروهای ضد بارداری هورمونی.

- در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به هر نوع بیماری از جمله بیماری های کبدی، کلیوی یا کیسه صفرا، سنگهای صفراوی.

## مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

## هشدارها :

- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید و بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده مصرف ننمائید.

- جهت اثربخشی بهتر دارو را همراه با غذا میل نمائید.

- مصرف این دارو را حتی در صورت بهبودی ادامه دهید و بدون مشورت با پزشک دارو را قطع نکنید.

- از رژیم غذایی کم چربی با کلسترول پایین تبعیت نمائید.

- بر حسب پاسخ شما به درمان، پزشک شما ممکن است میزان داروی شما را تدریجاً کاهش یا افزایش دهد.

- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید. اما اگر زمان نوبت بعدی رسیده است، از مصرف آن نوبت چشم پوشی کنید و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان ثابت نشده است.

