



# مترونیدازول

قرص روکشدار ۲۵۰ میلی گرم

## مقدار مصرف :

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند.

## عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید.

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند :

بی حسی، گزگز کردن، درد یا ضعف در دستها یا پاها (معمولاً با مصرف مقادیر زیاد یا طولانی مدت)، حملات تشنجی (معمولاً با مصرف مقادیر زیاد)، هر نوع تحریک ترشح دار یا خشک شدن مهبل که قبل از درمان وجود نداشته است، حساسیت مفرط (بثورات جلدی، کهیر، قرمزی یا خارش)، گلودرد و تب.

عوارضی که در صورت تداوم یا مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارند:

سرگیجه، منگی، سردرد، بی اشتها، اسهال، تهوع یا استفراغ، درد یا کرامپ های معده، تغییر در احساس طعم، خشکی دهان، احساس طعم نامطلوب یا تند فلزی.

در تعدادی از بیماران مترونیدازول باعث تیره شدن رنگ ادرار می شود که با قطع دارو برطرف می شود.

## مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد دارو، بیمار را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.

## شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

## راهنمایهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- در صورت سابقه حساسیت به مترونیدازول و یا هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی و ماده محافظ.

- در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به هر نوع بیماری از جمله اختلالات سیستم عصبی مرکزی مانند صرع، نارسایی شدید کبد، دیسکرازی خونی و بیماریهای قلبی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد انعقاد، فرآورده های حاوی الکل، دی سولفیرام، لیتیم، فنوباریتال، فنی توفین و سایمتیدین

## مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحدید پزشک متخصص.

## هشدارها :

- دوره درمان با این دارو را کامل کنید.

- برای کاهش تحریک گوارشی مترونیدازول را با غذا مصرف نمائید.

- در صورتیکه طی چند روز بهبودی حاصل نشد به پزشک مراجعه کنید.

- از مصرف فرآورده های حاوی الکل با این دارو خودداری کنید.

- در صورت بروز خشکی دهان از آدامس بدون شکر یا ذرات یخ استفاده کنید و اگر تا ۲ هفته خشکی دهان برطرف نشد به دندانپزشک مراجعه کنید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث سرگیجه یا منگی گردد لذا ضمن درمان با این دارو احتیاط کنید.

- برای جلوگیری از عفونت مجدد تریکوموناز، لازم است همسر بیمار نیز همزمان با بیمار درمان شود.

- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

