

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

### راهنمایهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، ماده محافظ و ماده رنگی
- در صورت مصرف داروهای ضد افسردگی و تری سیکلیک ها، استمی زول، ترفنادین، دیگوکسین، وارفارین، مهارکننده های مونو اکسیداز شامل فورازولیدون، پروکاربازین، سلزلین و داروهای سروتونرژیک
- در صورت ابتلا به بیماریهای مغزری، عقب ماندگی ذهنی، صرع، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، ماینا و کاهش وزن.

### مصرف در بارداری و شیردهی :

در بارداری و شیردهی فقط با تجویز پزشک متخصص مصرف شود.

### هشدارها :

- دارو را بدون مشورت با پزشک خود قطع نکنید.
- در مورد فراموش کردن زمان مصرف یک دوز از دارو با پزشک خود مشورت کنید.
- این دارو را تا ۱۴ روز بعد از مصرف MAOI مصرف نکنید زیرا باعث افزایش فشار خون و ایجاد تشنج میشود.
- اگر این دارو به مدت طولانی در بچه ها استفاده میشود باید رشد و وزن آنها مرتباً کنترل شود.
- مصرف این دارو در افراد مسن باید با دوز کمتری شروع شود چون کندتر از بدن خارج میشود.
- این دارو در بعضی افراد ایجاد خواب آلودگی میکند در نتیجه باید از کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند مثل رانندگی خودداری کنند.
- از مصرف نوشیدنیهای الکلی بپرهیزید.

### مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو توسط پزشک تعیین می گردد.

### عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو رفع می شود با این حال در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

شایع: کاهش توانایی جنسی

با شیوع کمتر: حساس شدن سینه ها، ضربان قلب تند یا نامنظم، تند حرف زدن، هیجان زدگی، تب، تشنج، خواب آلودگی، خشکی دهان، خونریزی بینی، ایجاد نقاط قرمز بر روی پوست، سندرم سروتونین (اسهال، تب، افزایش تعریق، تغییرات خلقی)

سایر عوارض در صورت بروز نیاز به توجه پزشکی ندارند و در طی دوره درمان با انطباق بدن با دارو رفع میشوند با این وجود در صورت ادامه هر کدام از این عوارض یا ادامه مزاحمت آنها با پزشک خود مشورت کنید.

شایع: کاهش اشتها یا کاهش وزن، اسهال، گیجی، خواب آلودگی، خشکی دهان، سردرد، افزایش تعریق، کرامپ یا درد ناحیه شکمی.

با شیوع کمتر: آشفته گی، اضطراب، تغییرات در بینایی، یبوست، برافروختگی و قرمزی پوست.

### مسمومیت:

بیمار را وادار به استفراغ کرده و سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

### شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

