

مبورین (Mebeverine)

دسته دارویی: ضد اسپاسم عضله صاف با اثر مستقیم (ماسکولوتروپیک)

برند داروسازی امین: Irimeb®

شکل دارویی: کپسول ۲۰۰ میلی گرمی آهسته رهش (SR)

نحوه عملکرد دارو

مبورین یک داروی ضد اسپاسم ماسکولوتروپیک (musculotropic antispasmodic) یعنی با اثر مستقیم روی عضله صاف روده است که اثر مهار چندان روی حرکات دودی طبیعی ندارد. بدون اثرات جانبی شبه آتروپین بوده و با کم کردن انقباضات عضله صاف روده باعث شل شدن عضلات و ایجاد تسکین اسپاسم های دردناک روده می گردد.

مشخصات فارماکوکینتیکی دارو

مبورین از راه خوراکی به سرعت جذب شده و در عرض ۳-۱ ساعت غلظت خونی پیک را ایجاد می کند. در خون ۷۵٪ به پروتئین متصل می شود. در کبد به طور کامل هیدرولیز شده و به اسید وراتریک و مبورین الکل تبدیل شده و به صورت این متابولیت ها از ادرار دفع می شود.

موارد مصرف دارو

مبورین برای تسکین علائم روده تحریک پذیر یا IBS (Irritable Bowel Syndrome) و اختلالات روده مثل درد قولنجی شکم ، اسهال متناوب با یبوست و نفخ مصرف می شود. IBS یک بیماری عملکرد روده است که به علت های مختلف مثل علت سایکولوژیکی (استرس ، اضطراب ، افسردگی) ، علت سروتونینی و علت تغییر فلورباکتریال روده ، ایجاد می گردد و علائم مهم آن دل درد ، نفخ ، تهوع ، یبوست، (در بیماری که سروتونین در دستگاه گوارش آنها فعالیت کم دارد) یا اسهال (در بیماری که سروتونین در دستگاه گوارش آنها فعالیت زیاد دارد) میباشد. مبورین در ضمن برای درمان کولون تحریک پذیر که مربوط به آنتریت ناحیه ای ، دیورتیکولیت و بیماریهای التهابی دستگاه گوارش باشد سودمند است .

مقدار و روش مصرف دارو

دوز دارو در بزرگسالان و بچه های بالای ۱۰ سال ، ۲۰۰ میلی گرم سه بار در روز بوده و بهتر است ۲۰ دقیقه قبل از غذا میل شود. پس از چند هفته و حصول اثرات مطلوب دوز دارو به تدریج کاهش داده می شود.

موارد منع مصرف دارو

- ۱- مصرف مبورین در بیمارانی که نسبت به آن آلرژی داشته باشند ممنوع است.
- ۲- در صورت ابتلا به ایلئوس فلجی (انسداد روده در نتیجه فقدان حرکات دودی) نباید مصرف شود.
- ۳- در بیماران مبتلا به پورفیریای حاد نباید مصرف شود.
- ۴- در بچه های زیر ۱۰ سال توصیه نمی شود.

عوارض جانبی دارو

مبورین ممکن است در بعضی از بیماران واکنش های آلرژیک مثل بثورات پوستی، کهیر، التهاب در لب ها و صورت و زبان (آنژیوادم) ایجاد کند. در بعضی از بیماران نیز ممکن است بندرت ایجاد سردرد ، سرگیجه ، اختلالات گوارشی مثل یبوست و کم شدن اشتها نماید.

نکات آموزشی درباره این دارو

- ۱- با توجه به اینکه مبورین اثر شبه آتروپینی ندارد مصرف آن در بیماران مبتلا به گلوکوم و هیپرتروفی پروستات ممنوع نیست (بر عکس داروهای آنتی کولینرژیک).
- ۲- مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.
- ۳- در موقع رانندگی ممکن است اختلال ایجاد نماید.
- ۴- در بیمارانی که نارسایی شدید کبدی یا کلیوی دارند باید با احتیاط لازم مصرف شود.

شرایط نگهداری دارو

دارو دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

نوع بسته بندی دارو

جعبه حاوی بلیسترهای ۱۰ عددی