

ویتامین A+D

ویتامین A+D+C

A+D+Fe+Zn

دسته دارویی: مکمل ویتامینی و الکترولیت

برند داروسازی امین: Aditen[®] ، Aditen-C[®] و Aditen Plus Mineral[®]

شکل دارویی: قطره خوراکی ۱۵ و ۳۰ میلی لیتری Aditen

قطره خوراکی ۳۰ میلی لیتری Aditen-C

قطره خوراکی ۱۵ میلی لیتری Aditen plus Mineral

نحوه عملکرد دارو

یک میلی لیتر از قطره خوراکی Aditen[®] حاوی ۱۵۰۰ واحد بین المللی ویتامین A و ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین D₃ و ۳ میلی گرم ماده شیرین کننده (ساکارین) است.

یک میلی لیتر قطره Aditen-C[®] حاوی ۱۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین A ، ۲۰۰ واحد بین المللی ویتامین D₃ و ۴۰ میلی گرم ویتامین C می باشد.

یک میلی لیتر از قطره خوراکی Aditen Plus Mineral[®] حاوی ۱۵۰۰ IU ویتامین A ، ۴۰۰ IU ویتامین D₃ ، ۵ میلی گرم زینک (به صورت گلوکونات) و ۱۵ میلی گرم آهن (به صورت فرس سلفات هیدراته) و ۰/۵ میلی گرم شیرین کننده (ساکارین) می باشد.

ویتامین A از راه خوراکی در پیشگیری و درمان علائم کمبود ویتامین A موثر است. در بچه ها باید با دوزهای توصیه شده بر اساس سن بچه مصرف شود:

در بچه های تا ۳ سال کمتر از ۲۰۰ واحد در روز

در بچه های ۴ تا ۸ سال کمتر از ۳۰۰۰ واحد در روز

در بچه های ۹ تا ۱۳ سال کمتر از ۵۷۰۰ واحد در روز

در بچه های ۱۴ تا ۱۸ سال کمتر از ۹۳۰۰ واحد در روز

ویتامین A با دوز های بیشتر از دوز توصیه شده می تواند اثرات جانبی مثل افزایش تحریک پذیری ، استفراغ ، اسهال ، سردرد ، مشکلات دید ، ریزش لایه خارجی پوست (اپیدرم) ایجاد کند.

کمبود **ویتامین D** می تواند در بچه ها باعث ایجاد راشیتیس شود. ویتامین D برای پیشگیری و درمان راشیتیس مصرف می شود. ویتامین D در تنظیم مقدار کلسیم و فسفر در بدن دخیل است. یک میلی لیتر از قطره های خوراکی Aditen ، Aditen Plus Mineral ، مثل اکثر مکمل ها ، ۴۰۰ واحد بین المللی (۱۰ میکروگرم) ویتامین D دارد که دوز مناسب برای بچه ها می باشد.

ویتامین C برای ساخته شدن کلاژن و ترمیم بافت ضروری است و در واکنش های اکسیداسیون و مسیرهای متابولیک مثل سنتز کارنیتین و تبدیل اسید فولیک به اسید فولینیک دخیل است. برای پیشگیری و درمان اسکوربوت مصرف می شود.

کمبود **زینک** می تواند باعث تسریع علائم کمبود ویتامین A شود و مصرف مکمل های حاوی ویتامین A و زینک برای اصلاح این وضعیت سودمند است. زینک کوفاکتور تعداد زیادی از آنزیم ها است که برای متابولیسم کربوهیدرات و پروتئین مهم هستند . زینک برای رشد طبیعی و ترمیم بافت لازم است. آهن برای پیشگیری و درمان کم خونی فقر آهن ضروری است.

شرایط نگهداری

دارو دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

نوع بسته بندی دارو

Aditen : شیشه ۱۵ و ۳۰ میلی لیتری

Aditen-C : شیشه ۳۰ میلی لیتری

Aditen plus mineral : شیشه ۱۵ میلی لیتری